# SOS LES NUDS – juin/oct 2014
## 1ère Nice d'espèces non-marines

Nouveau concept : Nice d'espèces non-marines de plus en plus présentes à l'aquarium. Reproduction possible ? Nécessaire ? Utile ? Intéressant ? Dans quel but ? Quelles espèces ?

Ce sujet est un peu différent des autres, il ne s'agit pas de présenter des espèces marines mais des espèces non-marines de plus en plus présentes à l'aquarium. Ces espèces sont souvent introduites par des plantes ou des animaux marins et ne semblent représenter aucun danger, même si leur présence à l'aquarium est parfois très surprenante.

Il y a quelques années, j'ai découvert dans mon aquarium des petites limaces de mer. Je les ai toutes mises dans un bocal pour les observer et j'ai fini par les relâcher dans mon aquarium.

Ce sujet est une présentation de ces espèces non-marines que j'ai pu observer dans mon aquarium.

Sommaire

Introduction
Les différents types d'espèces non-marines
Les différentes espèces non-marines
Les différentes espèces non-marines
Les différentes

Elle se fixe toujours sur le dos de la Tortue Luth, et ne la quitte que très rarement. Elle est très commune dans les eaux chaudes et tempérées, mais rapporte peu d'intérêt. Elle est très commune dans l'Océan Pacifique, et on la trouve également dans l'Océan Indien et dans l'Océan Atlantique.



Tortue Luth, Dermochelys coriacea



Tortue Luth, Dermochelys coriacea

**Lepidium spec**
Nudibranche

Taille : 2 cm
Habitat : Océan Pacifique
Nourriture : Eponges



Lepidium spec



Lepidium spec

**Lepto Urticifera / Calcaricauda**
Hydrozoaire - Hydroïdes

Taille : 1 cm
Habitat : Océan Pacifique
Nourriture : Plancton

Lepto Urticifera / Calcaricauda



Lepto Urticifera / Calcaricauda

**Leptogorgia virgulata**
Cnidaire - Gorgone

Taille : 1 m
Habitat : Océan Pacifique
Nourriture : Plancton

Leptogorgia virgulata



Leptogorgia virgulata

**Eponge à cratère**
*Haliclona (Haliclona) oculata*



Haliclona (Haliclona) oculata - Photo Ifremer

Taille : 15 cm
Profondeur : 0 à 30 m
Habitat : Sur substrat dur
Répartition : Manche, Mer du Nord, Atlantique
Confusion possible : Haliclona (Haliclona) viscosa

Cette éponge est commune sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Elle est facilement reconnaissable à ses cratères (oscules) qui peuvent atteindre 5 cm de diamètre. Elle est de couleur variable, allant du jaune au violet en passant par le brun et le vert. Elle vit sur substrat dur, de la zone intertidale jusqu'à 30 m de profondeur. Elle peut former des colonies importantes.

**Eponge à cratère**
*Haliclona (Haliclona) viscosa*



Haliclona (Haliclona) viscosa - Photo Ifremer

Taille : 15 cm
Profondeur : 0 à 30 m
Habitat : Sur substrat dur
Répartition : Manche, Mer du Nord, Atlantique
Confusion possible : Haliclona (Haliclona) oculata

Corail Cerveau - Pachyseris speciosa
Pachyseris speciosa (Dana, 1846)
Famille : Agariciidae
Ordre : Scléractiniaires
Classe : Anthozoaires
Embranchement : Cnidaires
Règne : Animaux
Taille : 10 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Répartition : Indo-Pacifique
Mode de vie : Colonial
Mode de reproduction : Sexué
Type de reproduction : Ovipare
Régime alimentaire : Photosynthétique
Température : 23 - 29 °C
Salinité : 34 - 36 ppt
Lumière : Faible à modérée
Courant : Faible à modéré
Description : Forme des colonies : Encroûtantes, lamellaires ou foliacées. Aspect des polypes : Polypes petits, peu saillants, formant des vallées sinueuses rappelant un cerveau. Couleurs : Brun, beige, vert olive, parfois avec des reflets violacés. Squelette : Très dense, calcaire, typique des Agariciidae.
Références : Wikipedia

Corail Cerveau - Pachyseris speciosa
Pachyseris speciosa (Dana, 1846)
Famille : Agariciidae
Ordre : Scléractiniaires
Classe : Anthozoaires
Embranchement : Cnidaires
Règne : Animaux
Taille : 10 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Répartition : Indo-Pacifique
Mode de vie : Colonial
Mode de reproduction : Sexué
Type de reproduction : Ovipare
Régime alimentaire : Photosynthétique
Température : 23 - 29 °C
Salinité : 34 - 36 ppt
Lumière : Faible à modérée
Courant : Faible à modéré
Description : Forme des colonies : Encroûtantes, lamellaires ou foliacées. Aspect des polypes : Polypes petits, peu saillants, formant des vallées sinueuses rappelant un cerveau. Couleurs : Brun, beige, vert olive, parfois avec des reflets violacés. Squelette : Très dense, calcaire, typique des Agariciidae.
Références : Wikipedia

Acropora Table - Acropora hyacinthus
Acropora hyacinthus (Dana, 1846)
Famille : Acroporidae
Ordre : Scléractiniaires
Classe : Anthozoaires
Embranchement : Cnidaires
Règne : Animaux
Taille : 1 m
Profondeur : 1 - 30 m
Répartition : Indo-Pacifique
Mode de vie : Colonial
Mode de reproduction : Sexué
Type de reproduction : Ovipare
Régime alimentaire : Photosynthétique
Température : 23 - 29 °C
Salinité : 34 - 36 ppt
Lumière : Forte
Courant : Modéré à fort
Description : Forme des colonies : Tables horizontales larges, parfois en forme de parasol. Aspect des polypes : Polypes petits, disposés en rangées régulières sur la surface supérieure. Couleurs : Brun, vert, bleu, violet, souvent avec des extrémités claires. Squelette : Très dense, calcaire, typique des Acropor

**Acropora cytherea**
(Dana, 1846)
Synonymes : Acropora cytherea (Dana, 1846)
Acropora cytherea (Dana, 1846)
Acropora cytherea (Dana, 1846)

Synonyme : Ecrevisse de Bermudes, Homard de Bermudes, Homard bleu, Homard de Floride, Homard de Virginie, Homard du Maine, Homard du Massachusetts, Homard du New Jersey, Homard du Rhode Island, Homard du Vermont, Homard d'Amérique, Homard du Canada, Homard du Nord, Homard de la côte est, Homard de la côte nord-est, Homard de la côte nord-ouest, Homard de la côte sud-est, Homard de la côte sud-ouest, Homard de la côte ouest, Homard de la côte est-ouest, Homard de la côte nord-sud, Homard de la côte est-sud, Homard de la côte ouest-nord, Homard de la côte ouest-sud, Homard de la côte nord-est-ouest, Homard de la côte nord-ouest-est, Homard de la côte sud-est-ouest, Homard de la côte sud-ouest-est, Homard de la côte est-nord-ouest, Homard de la côte est-sud-ouest, Homard de la côte ouest-nord-est, Homard de la côte ouest-sud-est, Homard de la côte nord-est-sud-ouest, Homard de la côte nord-ouest-sud-est, Homard de la côte sud-est-nord-ouest, Homard de la côte sud-ouest-nord-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest, Homard de la côte est-sud-est-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud, Homard de la côte nord-ouest-est-sud, Homard de la côte sud-est-ouest-nord, Homard de la côte sud-ouest-est-nord, Homard de la côte est-nord-est-sud-ouest, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest-nord, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-ouest, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-est, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est, Homard de la côte nord-ouest-est-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest, Homard de la côte sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest, Homard de la côte sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest, Homard de la côte est-nord-est-ouest-sud-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte est-sud-est-nord-ouest-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-ouest, Homard de la côte ouest-nord-ouest-est-sud-est-ouest-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est-ouest, Homard de la côte ouest-sud-ouest-est-nord-est-sud-est-ouest-nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-ouest, Homard de la côte nord-est-ouest-sud-est-ouest-nord-est-sud-ouest-est-nord-est-ouest-sud-est-ouest

Nombre: 50 (and 60+ on 2)
Taille: 1 cm (0.4 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Moyenne
Habitat: Récifs frangeants, lagons, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Algivore, Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge flavissima**
Lemonpeel Angelfish
Poisson-ange citron

Centropyge flavissima - Lemonpeel Angelfish - Poisson-ange citron

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge loricula**
Flame Angelfish
Poisson-ange flamme

Centropyge loricula - Flame Angelfish - Poisson-ange flamme

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge multicolor**
Multicolor Angelfish
Poisson-ange multicolore

Centropyge multicolor - Multicolor Angelfish - Poisson-ange multicolore

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge potteri**
Potter's Angelfish
Poisson-ange de Potter

Centropyge potteri - Potter's Angelfish - Poisson-ange de Potter

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge resplendens**
Resplendent Angelfish
Poisson-ange resplendissant

Centropyge resplendens - Resplendent Angelfish - Poisson-ange resplendissant

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge tibicen**
Keyhole Angelfish
Poisson-ange à trou

Centropyge tibicen - Keyhole Angelfish - Poisson-ange à trou

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge vrolikii**
Flame Angelfish
Poisson-ange flamme

Centropyge vrolikii - Flame Angelfish - Poisson-ange flamme

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Chaetodontoplus duboulayi**
Scribbled Angelfish
Poisson-ange zébré

Chaetodontoplus duboulayi - Scribbled Angelfish - Poisson-ange zébré

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Chaetodontoplus mesoleucus**
Vermiculated Angelfish
Poisson-ange vermiculé

Chaetodontoplus mesoleucus - Vermiculated Angelfish - Poisson-ange vermiculé

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus bellus**
Pygmy Angelfish
Poisson-ange nain

Genicanthus bellus - Pygmy Angelfish - Poisson-ange nain

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus lamarck**
Lamarck's Angelfish
Poisson-ange de Lamarck

Genicanthus lamarck - Lamarck's Angelfish - Poisson-ange de Lamarck

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus melanospilos**
Blackspot Angelfish
Poisson-ange à tache noire

Genicanthus melanospilos - Blackspot Angelfish - Poisson-ange à tache noire

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus personatus**
Masked Angelfish
Poisson-ange masqué

Genicanthus personatus - Masked Angelfish - Poisson-ange masqué

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus semifasciatus**
Semicircle Angelfish
Poisson-ange demi-cercle

Genicanthus semifasciatus - Semicircle Angelfish - Poisson-ange demi-cercle

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus watanabei**
Watanabe's Angelfish
Poisson-ange de Watanabe

Genicanthus watanabei - Watanabe's Angelfish - Poisson-ange de Watanabe

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Holacanthus ciliaris**
Queen Angelfish
Poisson-ange reine

Holacanthus ciliaris - Queen Angelfish - Poisson-ange reine

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Holacanthus tricolor**
Rock Beauty
Poisson-ange tricolore

Holacanthus tricolor - Rock Beauty - Poisson-ange tricolore

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus annularis**
Blue Ring Angelfish
Poisson-ange à anneau bleu


Pomacanthus annularis - Blue Ring Angelfish - Poisson-ange à anneau bleu

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus asfur**
Asfur Angelfish
Poisson-ange asfur


Pomacanthus asfur - Asfur Angelfish - Poisson-ange asfur

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus chrysurus**
Semicircle Angelfish
Poisson-ange demi-cercle


Pomacanthus chrysurus - Semicircle Angelfish - Poisson-ange demi-cercle

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus imperator**
Emperor Angelfish
Poisson-ange empereur


Pomacanthus imperator - Emperor Angelfish - Poisson-ange empereur

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus maculosus**
Yellowbar Angelfish
Poisson-ange à barre jaune


Pomacanthus maculosus - Yellowbar Angelfish - Poisson-ange à barre jaune

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus navarchus**
Blue Angelfish
Poisson-ange bleu


Pomacanthus navarchus - Blue Angelfish - Poisson-ange bleu

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus paru**
French Angelfish
Poisson-ange français


Pomacanthus paru - French Angelfish - Poisson-ange français

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus semicirculatus**
Koran Angelfish
Poisson-ange koran


Pomacanthus semicirculatus - Koran Angelfish - Poisson-ange koran

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus sexstriatus**
Six-banded Angelfish
Poisson-ange à six bandes


Pomacanthus sexstriatus - Six-banded Angelfish - Poisson-ange à six bandes

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pomacanthus xanthometopon**
Blueface Angelfish
Poisson-ange à face bleue


Pomacanthus xanthometopon - Blueface Angelfish - Poisson-ange à face bleue

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Pygoplites diacanthus**
Regal Angelfish
Poisson-ange royal


Pygoplites diacanthus - Regal Angelfish - Poisson-ange royal

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge argi**
Cherub Angelfish
Poisson-ange chérubin


Centropyge argi - Cherub Angelfish - Poisson-ange chérubin

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge bicolor**
Bicolor Angelfish
Poisson-ange bicolore


Centropyge bicolor - Bicolor Angelfish - Poisson-ange bicolore

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge boylei**
Boyle's Angelfish
Poisson-ange de Boyle


Centropyge boylei - Boyle's Angelfish - Poisson-ange de Boyle

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge eibli**
Eibl's Angelfish
Poisson-ange d'Eibl


Centropyge eibli - Eibl's Angelfish - Poisson-ange d'Eibl

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge ferrugata**
Russet Angelfish
Poisson-ange fauve


Centropyge ferrugata - Russet Angelfish - Poisson-ange fauve

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge fisheri**
Twospot Angelfish
Poisson-ange à deux taches


Centropyge fisheri - Twospot Angelfish - Poisson-ange à deux taches

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge heraldi**
Yellow Angelfish
Poisson-ange jaune


Centropyge heraldi - Yellow Angelfish - Poisson-ange jaune

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge interrupta**
Pygmy Angelfish
Poisson-ange nain


Centropyge interrupta - Pygmy Angelfish - Poisson-ange nain

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge loriculus**
Flame Angelfish
Poisson-ange flamme


Centropyge loriculus - Flame Angelfish - Poisson-ange flamme

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge nigriocella**
Black-spotted Angelfish
Poisson-ange à tache noire


Centropyge nigriocella - Black-spotted Angelfish - Poisson-ange à tache noire

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge nox**
Midnight Angelfish
Poisson-ange minuit


Centropyge nox - Midnight Angelfish - Poisson-ange minuit

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge nufer**
Nufer's Angelfish
Poisson-ange de Nufer


Centropyge nufer - Nufer's Angelfish - Poisson-ange de Nufer

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge potteri**
Potter's Angelfish
Poisson-ange de Potter


Centropyge potteri - Potter's Angelfish - Poisson-ange de Potter

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge resplendens**
Resplendent Angelfish
Poisson-ange resplendissant


Centropyge resplendens - Resplendent Angelfish - Poisson-ange resplendissant

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge tibicen**
Keyhole Angelfish
Poisson-ange à trou


Centropyge tibicen - Keyhole Angelfish - Poisson-ange à trou

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Centropyge vrolikii**
Flame Angelfish
Poisson-ange flamme


Centropyge vrolikii - Flame Angelfish - Poisson-ange flamme

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Chaetodontoplus duboulayi**
Scribbled Angelfish
Poisson-ange zébré


Chaetodontoplus duboulayi - Scribbled Angelfish - Poisson-ange zébré

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Chaetodontoplus mesoleucus**
Vermiculated Angelfish
Poisson-ange vermiculé


Chaetodontoplus mesoleucus - Vermiculated Angelfish - Poisson-ange vermiculé

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus bellus**
Pygmy Angelfish
Poisson-ange nain


Genicanthus bellus - Pygmy Angelfish - Poisson-ange nain

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus lamarck**
Lamarck's Angelfish
Poisson-ange de Lamarck


Genicanthus lamarck - Lamarck's Angelfish - Poisson-ange de Lamarck

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus melanospilos**
Blackspot Angelfish
Poisson-ange à tache noire


Genicanthus melanospilos - Blackspot Angelfish - Poisson-ange à tache noire

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus personatus**
Masked Angelfish
Poisson-ange masqué


Genicanthus personatus - Masked Angelfish - Poisson-ange masqué

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus semifasciatus**
Semicircle Angelfish
Poisson-ange demi-cercle


Genicanthus semifasciatus - Semicircle Angelfish - Poisson-ange demi-cercle

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif
Habitat: Récifs frangeants, tombants
Comportement: Solitaire, Territorial, Diurne
Nourriture: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Commentaire: Mâle territorial

Remarks: No public domain, cette version est essentiellement basée sur ce forum et un ordinateur.
Ce poisson est très territorial et peut être agressif envers les autres mâles. Il faut au moins 50 gallons pour un couple.

**Genicanthus watanabei**
Watanabe's Angelfish
Poisson-ange de Watanabe


Genicanthus watanabei - Watanabe's Angelfish - Poisson-ange de Watanabe

Nombre: 1
Taille: 15 cm (5.9 in)
Vitesse: Moyenne
Agressivité: Agressif

**Lobophyllia corymbosa**
Lobophyllidae
Corymbo - Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia
Corymbo - Corymbo, Back - Corymbo, Back
Corymbo - Corymbo, Back - Corymbo, Back
Corymbo - Corymbo, Back - Corymbo, Back

Soft Porcfungia

**Cynarina lacrymalis - Lovelli**
Cynarina lacrymalis - Lovelli
Cynarina - Lovelli

Soft Porcfungia

**Galaxea fascicularis - Galaxea**
Galaxea fascicularis - Galaxea
Galaxea - Galaxea

Soft Porcfungia

**Lobophyllia hemprichii - Lobophyllia**
Lobophyllia hemprichii - Lobophyllia
Lobophyllia - Lobophyllia

Les coraux durs peuvent être divisés en deux groupes principaux : les coraux durs hermatypiques et les coraux durs ahermatypiques.

Les coraux durs hermatypiques sont ceux qui contiennent des zooxanthelles et qui ont besoin de lumière pour survivre et croître. Ils comptent sur la présence de petits organismes unicellulaires et de la photosynthèse pour fournir de l'énergie et de la nourriture à leurs tissus. Les coraux durs hermatypiques sont généralement trouvés dans les eaux peu profondes et claires des récifs coralliens, où ils peuvent former de grandes structures complexes qui abritent une grande variété de vie marine.

Les coraux durs ahermatypiques, quant à eux, ne contiennent pas de zooxanthelles et peuvent vivre dans une variété plus large d'habitats, y compris dans des eaux plus profondes et plus froides. Ils ne dépendent pas de la lumière pour leur survie et peuvent obtenir de la nourriture en capturant des particules de nourriture dans l'eau à l'aide de leurs tentacules. Les coraux durs ahermatypiques ne forment généralement pas de grandes structures récifales comme les coraux durs hermatypiques, mais ils peuvent former des colonies ou des agrégations plus petites.

Dans l'ensemble, les coraux durs hermatypiques et ahermatypiques jouent tous deux un rôle important dans les écosystèmes coralliens, mais les hermatypiques sont généralement considérés comme plus importants en raison de leur capacité à former des structures récifales complexes qui fournissent un habitat à une grande variété d'autres espèces.



Les coraux durs hermatypiques sont ceux qui contiennent des zooxanthelles et qui ont besoin de lumière pour survivre et croître. Ils comptent sur la présence de petits organismes unicellulaires et de la photosynthèse pour fournir de l'énergie et de la nourriture à leurs tissus. Les coraux durs hermatypiques sont généralement trouvés dans les eaux peu profondes et claires des récifs coralliens, où ils peuvent former de grandes structures complexes qui abritent une grande variété de vie marine.

Les coraux durs ahermatypiques, quant à eux, ne contiennent pas de zooxanthelles et peuvent vivre dans une variété plus large d'habitats, y compris dans des eaux plus profondes et plus froides. Ils ne dépendent pas de la lumière pour leur survie et peuvent obtenir de la nourriture en capturant des particules de nourriture dans l'eau à l'aide de leurs tentacules. Les coraux durs ahermatypiques ne forment généralement pas de grandes structures récifales comme les coraux durs hermatypiques, mais ils peuvent former des colonies ou des agrégations plus petites.

Dans l'ensemble, les coraux durs hermatypiques et ahermatypiques jouent tous deux un rôle important dans les écosystèmes coralliens, mais les hermatypiques sont généralement considérés comme plus importants en raison de leur capacité à former des structures récifales complexes qui fournissent un habitat à une grande variété d'autres espèces.

## Coraux mous



**corail champignon**
*Rhodactis sp.*
Origine : Indonésie
Taille : 5 cm
Prix : 15 €

**gracile fleshy soup**
*Leptogorgia gracilis*
Fleshy soup
Leptogorgia
Gorgoniidae
Octocorallia
Cnidaria
Animalia
Taxonomy
Leptogorgia gracilis (Verrill, 1868)
Gorgonia gracilis Verrill, 1868
Leptogorgia gracilis (Verrill, 1868)
Leptogorgia gracilis (Verrill, 1868)
Leptogorgia gracilis (Verrill, 1868)

**cyanée**
**Cyanea capillata**
Linnaeus, 1758
Cyaneidae - Cyaneinae - Cyanea
Méduses - Scyphozoa

Taille : 30 cm - 2 m
Profondeur : 0 - 200 m
Habitat : pélagique
Répartition : Atlantique Nord, Pacifique Nord, Arctique
Description : ombrelle pouvant atteindre 2 m de diamètre, de couleur rouge à violacée, avec des tentacules pouvant atteindre 30 m de longueur, disposés en 8 groupes de 70 à 150 tentacules. Les tentacules sont rouges à violacés et disposés en

Ecrevisse - Ecrevisse - Ecrevisse -

**Alcyonium digitatum**
Dead man's fingers
Alcyonium digitatum
Linnaeus, 1758
Taille adulte : 20 cm
Taille maximale : 30 cm
Profondeur : 0 - 200 m
Température : 4 - 14 °C
Salinité : 30 - 35 ‰
Courant : faible à fort
Exposition : abrité à battu
Substrat : dur
Habitat : Roche, Blocs, Tombants, Epaves, Fonds de sable, Fonds de vase, Fonds de maërl, Fonds de gravier, Fonds de galets, Fonds de coquilles, Fonds de cailloutis, Fonds de graviers, Fonds de sables, Fonds de vases
Alcyonium digitatum © Ifremer - Nicolas Thouard, Observation du 2 juillet 2008 à 20 m de profondeur, Mer d'Iroise, Bretagne, Ile d'Ouessant, Le Stiff

Les colonies de polypiers peuvent se développer sur des algues, des hydraires ou autres des roches. Attention de l'hivernie pour la différencier.

**Aplidium elegans**
Aplidium elegans
(Verrill, 1885)
Taille adulte : 5 cm
Taille maximale : 10 cm
Profondeur : 0 - 200 m
Température : 4 - 14 °C
Salinité : 30 - 35 ‰
Courant : faible à fort
Exposition : abrité à battu
Substrat : dur
Habitat : Roche, Blocs, Tombants, Epaves, Fonds de sable, Fonds de vase, Fonds de maërl, Fonds de gravier, Fonds de galets, Fonds de coquilles, Fonds de cailloutis, Fonds de graviers, Fonds de sables, Fonds de vases
Aplidium elegans © Ifremer - Nicolas Thouard, Observation du 2 juillet 2008 à 20 m de profondeur, Mer d'Iroise, Bretagne, Ile d'Ouessant, Le Stiff

Les colonies de tuniciers peuvent se développer sur des algues, des hydraires ou autres des roches. Attention de l'hivernie pour la différencier.

**Aplidium punctum**
Aplidium punctum
Milne Edwards, 1841
Taille adulte : 5 cm
Taille maximale : 10 cm
Profondeur : 0 - 200 m
Température : 4 - 14 °C
Salinité : 30 - 35 ‰
Courant : faible à fort
Exposition : abrité à battu
Substrat : dur
Habitat : Roche, Blocs, Tombants, Epaves, Fonds de sable, Fonds de vase, Fonds de maërl, Fonds de gravier, Fonds de galets, Fonds de coquilles, Fonds de cailloutis, Fonds de graviers, Fonds de sables, Fonds de vases
Aplidium punctum © Ifremer - Nicolas Thouard, Observation du 2 juillet 2008 à 20 m de profondeur, Mer d'Iroise, Bretagne, Ile d'Ouessant, Le Stiff

Les colonies de tuniciers peuvent se développer sur des algues, des hydraires ou autres des roches. Attention de l'hivernie pour la différencier.

**Aplidium sp.**
Aplidium sp.
Taille adulte : 5 cm
Taille maximale : 10 cm
Profondeur : 0 - 200 m
Température : 4 - 14 °C
Salinité : 30 - 35 ‰
Courant : faible à fort
Exposition : abrité à battu
Substrat : dur
Habitat : Roche, Blocs, Tombants, Epaves, Fonds de sable, Fonds de vase, Fonds de maërl, Fonds de gravier, Fonds de galets, Fonds de coquilles, Fonds de cailloutis, Fonds de graviers, Fonds de sables, Fonds de vases
Aplidium sp.

**Linckia laevigata**
(Linnaeus, 1758)
Linckia bleue

Linckia laevigata
Linckia bleue
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 30 m
Habitat : Récifs coralliens
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Régime : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Comportement : Diurne

**Astéries**

**Astérie : Asterias rubens**

Linnaeus, 1758

Classification : Echinodermes

Taille : 15 à 40 cm

Habitat : Fonds rocheux, sableux ou vaseux, de la zone intertidale à 200 m de profondeur

Répartition : Atlantique Nord-Est, Manche, Mer du Nord, Mer Baltique

Régime alimentaire : Carnivore

Reproduction : Ponte de mai à juillet

Longévité : 5 à 7 ans



Astérie rouge - Asterias rubens - Linnaeus, 1758 - Mer du Nord, Pas-de-Calais, France - © Nicolas Barré

**Sphaeramia nematoptera** (Bleeker, 1850)
Poissons-cardinaux, Apogonidae
Longueur max. : 15 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Eaux tropicales
Indo-Pacifique : Afrique du Sud, mer Rouge, Océan Indien, Indonésie, Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Hawaï.
Espèce commune, vivant en petits groupes dans les eaux peu profondes, souvent à proximité des récifs coralliens. Elle se nourrit de petits crustacés planctoniques. Les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves.



**Sphaeramia orbicularis** (Cuvier, 1828

**[Asterina gibbosa](#)** (Penn., 1838)



Synonyme : Asterina pancerii (Gasco, 1870)

Classification : Asteroidea, Valvatacea, Asterinidae

Taille : 3 cm

Description : Face dorsale lisse, avec des granules arrondis, plus ou moins saillants, de taille variable, répartis irrégulièrement. Ils sont plus petits et plus nombreux sur les bras. Face orale avec des plaques adambulacraires portant 3 à 4 piquants. Les piquants sont courts et pointus. Les plaques marginales sont petites et portent 2 à 3 piquants. Les pédicellaires sont absents. Couleur variable, souvent brune, verte ou rouge.

Habitat : Sur substrat rocheux, dans les failles et sous les pierres, entre 0 et 100 m de profondeur.

Répartition : Méditerranée, Atlantique Est, Mer Noire.

Observations : Espèce commune et facile à observer. Elle se nourrit de matière organique déposée sur le substrat.



Asterina gibbosa, Spain, Mar Menor, Murcia



Asterina gibbosa, Spain, Mar Menor, Murcia

**[Asterina gibbosa](#)** (Penn., 1838)



Synonyme : Asterina pancerii (Gasco, 1870)

Classification : Asteroidea, Valvatacea, Asterinidae

Taille : 3 cm

Description : Face dorsale lisse, avec des granules arrondis, plus ou moins saillants, de taille variable, répartis irrégulièrement. Ils sont plus petits et plus nombreux sur les bras. Face orale avec des plaques adambulacraires portant 3 à 4 piquants. Les piquants sont courts et pointus. Les plaques marginales sont petites et portent 2 à 3 piquants. Les pédicellaires sont absents. Couleur variable, souvent brune, verte ou rouge.

Habitat : Sur substrat rocheux, dans les failles et sous les pierres, entre 0 et 100 m de profondeur.

Répartition : Méditerranée, Atlantique Est, Mer Noire.

Observations : Espèce commune et facile à observer. Elle se nourrit de matière organique déposée sur le substrat.



Asterina gibbosa, Spain, Mar Menor, Murcia



Asterina gibbosa, Spain, Mar Menor, Murcia

**[Asterina wilsoni](#)** (Lütken, 1859)



Synonyme : Asterina wilsoni var. cylindrica (Lütken, 1859)

Classification : Asteroidea, Valvatacea, Asterinidae

Taille : 3 cm

Description : Face dorsale lisse, avec des granules arrondis, plus ou moins saillants, de taille variable, répartis irrégulièrement. Ils sont plus petits et plus nombreux sur les bras. Face orale avec des plaques adambulacraires portant 3 à 4 piquants. Les piquants sont courts et pointus. Les plaques marginales sont petites et portent 2 à 3 piquants. Les pédicellaires sont absents. Couleur variable, souvent brune, verte ou rouge.

Habitat : Sur substrat rocheux, dans les failles et sous les pierres, entre 0 et 100 m de profondeur.

Répartition : Méditerranée, Atlantique Est, Mer Noire.

Observations : Espèce commune et facile à observer. Elle se nourrit de matière organique déposée sur le substrat.



Asterina wilsoni, Spain, Mar Menor, Murcia



Asterina wilsoni

**[NEW] Urtica cucullata nympheis**
Nymphe Urtique
Urtica cucullata nympheis
Nymphe Urtique
Nymphe Urtique
Nymphe Urtique

**Actinia equina**
Linnaeus, 1758
Nom français : Anémone rouge
Nom anglais : Beadlet anemone
Nom allemand : Rote Seeanemone
Taille : 10 cm
Profondeur : 0 à 10 m
Habitat : Roches, blocs, cailloux, sable, vase, coquilles, fonds artificiels, ports, estuaires, mares, zone de balancement des marées
Répartition : Atlantique Est, Méditerranée, Mer Noire, Mer Rouge
Observé à : Cap Gris-Nez, Wimereux, Ambleteuse, Audresselles, Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Equihen-Plage, Hardelot-Plage, Le Touquet-Paris-Plage, Berck-sur-Mer, Fort-Mahon-Plage, Quend-Plage, Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Cayeux-sur-Mer, Le Hourdel, Le Hourdel, Le Hourdel

**CLAM, GIANT ATOP**
*Tridacna gigas (Linnaeus, 1758)*
Common name: Giant clam
Taxonomy: Animalia - Mollusca - Bivalvia - Tridacnidae
Max. size: 1.4 m
Max. Depth: 20 m
Temperament: Peaceful
Diet: Photosynthetic
Care: Moderately difficult
Reef Safe: Yes
Aquarium: Saltwater
Origin: Indo-Pacific
Range: Indo-Pacific
Habitat: Reef
Reproduction: Egg layer
Lifespan: 100 years

Tridacna gigas (Linnaeus, 1758) - Giant clam

Les mollusques bivalves géantissent sur les fonds durs en vue de la pointe. Ils se nourrissent à l'aide de microscopes de diatomées avec leurs vers de la vague qui s'approchent. Ils sont très sensibles à la qualité de l'eau et ne supportent pas les variations. Ils sont parfois utilisés comme indicateurs de la qualité de l'environnement. Ils peuvent vivre plusieurs décennies. Ils sont protégés par la législation. Ils sont parfois élevés en aquariums publics. Ils sont parfois élevés en aquariums publics. Ils sont parfois élevés en aquariums publics

Ce bestiaire recense les créatures issues de notre plan de création, et qui ne sont pas originaires d'un autre plan d'existence. Il est divisé en plusieurs sous-catégories, pour faciliter la recherche d'une créature en fonction de ses caractéristiques.

**Bestiaire de la Faune - Créatures Animales**

Ce bestiaire regroupe les créatures animales, Mammifères, Reptiles, Insectes, Oiseaux, Arachnides, Poissons, Crustacés, petites bestioles...

**Abeille Géante**



Les abeilles géantes sont des insectes de la taille d'un petit chien, qui vivent dans des ruches de la taille d'une maison. Elles sont très agressives et défendent leur ruche avec acharnement. Elles sont également très appréciées pour leur miel, qui est très nutritif et qui a des propriétés curatives.

**Abeille Géante Ouvrière**



Les abeilles géantes ouvrières sont les plus nombreuses de la ruche. Elles sont chargées de récolter le nectar et le pollen des fleurs, et de le ramener à la ruche. Elles sont également chargées de nourrir les larves et de nettoyer la ruche.

**Abeille Géante Reine**



La reine est la seule femelle de la ruche à pouvoir se reproduire. Elle est beaucoup plus grande que les ouvrières et peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Elle est également très protégée par les ouvrières, qui sont prêtes à donner leur vie pour elle.

**Abeille Géante Soldat**



Les abeilles géantes soldats sont chargées de défendre la ruche contre les prédateurs. Elles sont plus grandes et plus agressives que les ouvrières, et elles ont des dards plus longs et plus acérés. Elles sont également très résistantes aux attaques.

**Abeille Géante Mâle**



Les abeilles géantes mâles sont les seuls à ne pas avoir de dard. Ils sont chargés de féconder la reine. Ils sont également très grands et très forts, mais ils ne sont pas très agressifs.

**Abeille Géante Larve**



Les larves d'abeilles géantes sont blanches et ressemblent à des vers. Elles sont nourries par les ouvrières et grandissent rapidement. Elles se transforment en nymphes après quelques jours.

**Abeille Géante Nymphe**



Les nymphes d'abeilles géantes sont immobiles et ressemblent à des cocons. Elles sont protégées par les ouvrières et se développent rapidement. Elles se transforment en abeilles adultes après quelques jours.

**Abeille Géante Œuf**



Les œufs d'abeilles géantes sont blancs et ovales. Ils sont pondus par la reine et sont protégés par les ouvrières. Ils éclosent après quelques jours.

**Abeille Géante Miel**



Le miel d'abeilles géantes est très nutritif et a des propriétés curatives. Il est produit par les ouvrières et stocké dans des alvéoles de cire. Il est très apprécié par les humains et les animaux.

**Abeille Géante Cire**



La cire d'abeilles géantes est utilisée pour construire les alvéoles de la ruche. Elle est produite par les ouvrières et est très résistante. Elle est également très appréciée par les humains pour ses propriétés.

**Abeille Géante Propolis**



La propolis est une substance collante produite par les abeilles pour boucher les trous de la ruche. Elle est très résistante et a des propriétés antibactériennes. Elle est également très appréciée par les humains pour ses propriétés.

**Abeille Géante Gelée Royale**



La gelée royale est une substance produite par les ouvrières pour nourrir la reine. Elle est très nutritive et a des propriétés curatives. Elle est également très appréciée par les humains pour ses propriétés.

**Abeille Géante Pollen**



Le pollen d'abeilles géantes est collecté par les ouvrières et stocké dans des alvéoles de la ruche. Il est très nutritif et a des propriétés curatives. Il est également très apprécié par les humains pour ses propriétés.

**Abeille Géante Venin**



Le venin d'abeilles géantes est produit par les ouvrières et les soldats. Il est très toxique et peut causer des douleurs, des gonflements et des réactions allergiques. Il est également très apprécié par les humains pour ses propriétés.

**Abeille Géante Dard**



Les dards d'abeilles géantes sont situés à l'arrière de l'abdomen des ouvrières et des soldats. Ils sont très acérés et peuvent percer la peau des humains et des animaux. Ils sont également très dangereux car ils peuvent injecter du venin.

**Abeille Géante Antenne**



Les antennes d'abeilles géantes sont situées sur la tête des abeilles. Elles sont très sensibles et permettent aux abeilles de détecter les odeurs, les vibrations et les changements de température. Elles sont également très importantes pour la communication entre les abeilles.

**Abeille Géante Œil**



Les yeux d'abeilles géantes sont situés sur la tête des abeilles. Ils sont très sensibles et permettent aux abeilles de détecter les mouvements et les changements de lumière. Ils sont également très importants pour la navigation des abeilles.

**Abeille Géante Aile**



Les ailes d'abeilles géantes sont situées sur le thorax des abeilles. Elles sont très légères et très résistantes. Elles permettent aux abeilles de voler à des vitesses élevées et de parcourir de longues distances. Elles sont également très importantes pour la pollinisation des fleurs.

**Abeille Géante Patte**



Les pattes d'abeilles géantes sont situées sur le thorax des abeilles. Elles sont très poilues et permettent aux abeilles de collecter le pollen et le nectar des fleurs. Elles sont également très importantes pour la marche et le saut des abeilles.

**Abeille Géante Poil**



Les poils d'abeilles géantes sont très nombreux et recouvrent tout le corps des abeilles. Ils sont très fins et très doux au toucher. Ils permettent aux abeilles de collecter le pollen et le nectar des fleurs. Ils sont également très importants pour la thermorégulation des abeilles.

**Abeille Géante Couleur**



Les couleurs d'abeilles géantes sont très variées. Elles peuvent aller du jaune au noir, en passant par le rouge, le bleu et le vert. Elles sont également très importantes pour la communication entre les abeilles. Elles permettent aux abeilles de reconnaître les fleurs et de se reconnaître entre elles.

**Abeille Géante Odeur**



Les odeurs d'abeilles géantes sont très importantes pour la communication entre les abeilles. Elles permettent aux abeilles de reconnaître les fleurs, de se reconnaître entre elles et de marquer leur territoire. Elles sont également très importantes pour la navigation des abeilles.

**Abeille Géante Son**



Les sons d'abeilles géantes sont très importants pour la communication entre les abeilles. Elles permettent aux abeilles de se prévenir du danger, de se rassembler et de se disperser. Elles sont également très importantes pour la danse des abeilles.

**Abeille Géante Danse**



La danse des abeilles géantes est un moyen de communication très important. Elle permet aux abeilles de transmettre des informations sur la direction et la distance des fleurs. Elle est également très importante pour la navigation des abeilles.

**Abeille Géante Essaim**



Un essaim d'abeilles géantes est un groupe d'abeilles qui quitte la ruche pour fonder une nouvelle colonie. Il est composé de la reine, de nombreuses ouvrières et de quelques mâles. Il est très dangereux car les abeilles sont très agressives.

**Abeille Géante Ruche**



Les ruches d'abeilles géantes sont très grandes et peuvent contenir jusqu'à 50 000 abeilles. Elles sont construites en cire et sont très résistantes. Elles sont également très importantes pour la survie des abeilles.

**Abeille Géante Apiculteur**



Les apiculteurs d'abeilles géantes sont des personnes qui élèvent des abeilles géantes pour leur miel et leurs autres produits. Ils sont très importants pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Prédateur**



Les prédateurs d'abeilles géantes sont nombreux. Ils comprennent les oiseaux, les mammifères, les insectes et les araignées. Ils sont très dangereux pour les abeilles géantes.

**Abeille Géante Parasite**



Les parasites d'abeilles géantes sont nombreux. Ils comprennent les acariens, les vers et les champignons. Ils sont très dangereux pour les abeilles géantes.

**Abeille Géante Maladie**



Les maladies d'abeilles géantes sont nombreuses. Elles comprennent la loque américaine, la loque européenne et la nosémose. Elles sont très dangereuses pour les abeilles géantes.

**Abeille Géante Traitement**



Les traitements d'abeilles géantes sont nombreux. Ils comprennent les antibiotiques, les acaricides et les fongicides. Ils sont très importants pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Recherche**



La recherche sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de mieux comprendre les abeilles géantes et de trouver des moyens de les protéger. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Conservation**



La conservation des abeilles géantes est très importante. Elle permet de protéger les abeilles géantes et leur habitat. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Avenir**



L'avenir des abeilles géantes est incertain. Elles sont menacées par la perte de leur habitat, les pesticides et les maladies. Elles sont également très importantes pour la survie de l'humanité.

**Abeille Géante Conclusion**



Les abeilles géantes sont des insectes très importants pour la survie de l'humanité. Elles sont menacées par la perte de leur habitat, les pesticides et les maladies. Elles sont également très importantes pour la pollinisation des fleurs.

**Abeille Géante Bibliographie**



La bibliographie sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de mieux comprendre les abeilles géantes et de trouver des moyens de les protéger. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Remerciements**



Les remerciements sur les abeilles géantes sont très importants. Ils permettent de remercier les personnes qui ont contribué à la recherche sur les abeilles géantes. Ils sont également très importants pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Annexes**



Les annexes sur les abeilles géantes sont très importantes. Elles permettent de fournir des informations supplémentaires sur les abeilles géantes. Elles sont également très importantes pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des matières**



La table des matières sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les informations sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Index**



L'index sur les abeilles géantes est très important. Il permet de trouver rapidement les informations sur les abeilles géantes. Il est également très important pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Glossaire**



Le glossaire sur les abeilles géantes est très important. Il permet de définir les termes techniques utilisés dans le bestiaire. Il est également très important pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des illustrations**



La table des illustrations sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les illustrations sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des cartes**



La table des cartes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les cartes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des tableaux**



La table des tableaux sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les tableaux sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des figures**



La table des figures sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les figures sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des exemples**



La table des exemples sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les exemples sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des références**



La table des références sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les références sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des sources**



La table des sources sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les sources sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des auteurs**



La table des auteurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les auteurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des éditeurs**



La table des éditeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les éditeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des dates**



La table des dates sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les dates sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lieux**



La table des lieux sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lieux sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des personnages**



La table des personnages sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les personnages sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des événements**



La table des événements sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les événements sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des objets**



La table des objets sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les objets sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des concepts**



La table des concepts sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les concepts sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des théories**



La table des théories sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les théories sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des hypothèses**



La table des hypothèses sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les hypothèses sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lois**



La table des lois sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lois sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des règles**



La table des règles sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les règles sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des principes**



La table des principes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les principes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des valeurs**



La table des valeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les valeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des normes**



La table des normes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les normes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des standards**



La table des standards sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les standards sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des critères**



La table des critères sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les critères sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des indicateurs**



La table des indicateurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les indicateurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des mesures**



La table des mesures sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les mesures sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des unités**



La table des unités sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les unités sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des conversions**



La table des conversions sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les conversions sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des formules**



La table des formules sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les formules sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des équations**



La table des équations sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les équations sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des algorithmes**



La table des algorithmes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les algorithmes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des programmes**



La table des programmes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les programmes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des logiciels**



La table des logiciels sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les logiciels sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des applications**



La table des applications sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les applications sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des outils**



La table des outils sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les outils sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des ressources**



La table des ressources sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les ressources sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des références**



La table des références sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les références sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des sources**



La table des sources sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les sources sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des auteurs**



La table des auteurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les auteurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des éditeurs**



La table des éditeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les éditeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des dates**



La table des dates sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les dates sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lieux**



La table des lieux sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lieux sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des personnages**



La table des personnages sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les personnages sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des événements**



La table des événements sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les événements sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des objets**



La table des objets sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les objets sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des concepts**



La table des concepts sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les concepts sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des théories**



La table des théories sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les théories sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des hypothèses**



La table des hypothèses sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les hypothèses sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lois**



La table des lois sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lois sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des règles**



La table des règles sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les règles sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des principes**



La table des principes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les principes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des valeurs**



La table des valeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les valeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des normes**



La table des normes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les normes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des standards**



La table des standards sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les standards sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des critères**



La table des critères sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les critères sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des indicateurs**



La table des indicateurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les indicateurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des mesures**



La table des mesures sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les mesures sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des unités**



La table des unités sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les unités sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des conversions**



La table des conversions sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les conversions sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des formules**



La table des formules sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les formules sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des équations**



La table des équations sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les équations sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des algorithmes**



La table des algorithmes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les algorithmes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des programmes**



La table des programmes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les programmes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des logiciels**



La table des logiciels sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les logiciels sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des applications**



La table des applications sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les applications sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des outils**



La table des outils sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les outils sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des ressources**



La table des ressources sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les ressources sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des références**



La table des références sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les références sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des sources**



La table des sources sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les sources sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des auteurs**



La table des auteurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les auteurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des éditeurs**



La table des éditeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les éditeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des dates**



La table des dates sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les dates sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lieux**



La table des lieux sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lieux sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des personnages**



La table des personnages sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les personnages sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des événements**



La table des événements sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les événements sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des objets**



La table des objets sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les objets sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des concepts**



La table des concepts sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les concepts sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des théories**



La table des théories sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les théories sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des hypothèses**



La table des hypothèses sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les hypothèses sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des lois**



La table des lois sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les lois sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des règles**



La table des règles sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les règles sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des principes**



La table des principes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les principes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des valeurs**



La table des valeurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les valeurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des normes**



La table des normes sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les normes sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des standards**



La table des standards sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les standards sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des critères**



La table des critères sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les critères sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des indicateurs**



La table des indicateurs sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les indicateurs sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des mesures**



La table des mesures sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les mesures sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des unités**



La table des unités sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les unités sur les abeilles géantes. Elle est également très importante pour la survie des abeilles géantes.

**Abeille Géante Table des conversions**



La table des conversions sur les abeilles géantes est très importante. Elle permet de trouver rapidement les con

**Hypselodoris bullocki** (Quoy & Gaimard, 1832)

Synonyme(s) : Chromodoris bullocki, Hypselodoris bullocki

Taille maximale : 5 cm

Description : Manteau bleu foncé à violet, bordé d'une ligne blanche, puis d'une ligne orange. Présence de rhinophores et branchies orange. Présence de taches blanches sur le manteau et le notum. Le pied est violet avec une ligne orange. Présence de taches blanches sur le pied. Présence de taches blanches sur les rhinophores et les branchies. Présence de taches blanches sur les côtés du corps. Présence de taches blanches sur le dessus du corps. Présence de taches blanches sur le dessus de la tête. Présence de taches blanches sur le dessus du pied. Présence de taches blanches sur le dessus du manteau. Présence de taches blanches sur le dessus du notum

**Nom français :** Chromodoris magnifica

**Nom anglais :** Magnificent Chromodoris

**Nom scientifique :** Chromodoris magnifica (Quoy & Gaimard, 1832)

Taxonomie : Animalia, Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia, Chromodorididae, Chromodoris

Longueur : 5 cm

Profondeur : 0 - 30 m

Habitat : Récifs coralliens, Lagons, Pentes externes

Répartition : Indo-Pacifique, Océan Indien, Mer Rouge, Polynésie, Micronésie, Mélanésie, Australie, Japon

Comportement : Diurne, Nocturne

Alimentation : Éponges

Reproduction : Hermaphrodite

Statut UICN : Non évalué

Chromodoris magnifica (Quoy & Gaimard, 1832) Chromodoris magnifica (Quoy & Gaimard, 1832) Chromodoris magnifica (Quoy & Gaimard, 1832)

Tritoniidae Lamarck, 1809

Synonyme(s) :
Tritoniadae Lamarck, 1809 (orth. mut.)
Tritoniadidae Lamarck, 1809 (orth. mut.)

Les Tritoniidae sont une famille de gros nudibranches de taille moyenne à grande, pouvant atteindre 40 cm de long. Ils sont présents dans tous les océans du monde, mais sont plus abondants dans les eaux froides et tempérées. Ils se nourrissent principalement de cnidaires et d'autres nudibranches. Ils ont un corps allongé et mou, avec un manteau bien développé et des rhinophores et branchies plumeux. Ils ont également des tentacules oraux et des cérates dorsaux. Ils sont hermaphrodites et pondent des rubans d'œufs en spirale. Ils ont un cycle de vie complexe, avec des larves planctoniques et des stades juvéniles et adultes benthiques. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes marins en contrôlant les populations de leurs proies et en servant de source de nourriture à d'autres animaux. Leur coloration est souvent cryptique, leur permettant de se fondre dans leur environnement. Ils produisent également des toxines pour se défendre contre les prédateurs. Ils sont parfois recherchés par les aquariophiles pour leur beauté et leur curiosité, mais leur élevage en captivité est difficile. Ils sont menacés par la pollution et la destruction de leurs habitats, et leur conservation est importante pour maintenir la biodiversité marine.


Tritoniidae Lamarck, 1809 - Tritonia hombergii Cuvier, 1803 - Photographe : Nick Hobgood

Sous-familles et genres de Tritoniidae selon WoRMS :

Sous-famille Tritoniinae Lamarck, 1809
Genre Tritonia Cuvier, 1803
Genre Duvaucelia Audouin, 1826
Genre Marianina Gray, 1850
Genre Tritoniella Bergh, 1877

Sous-famille Tritonilidiinae Odhner, 1934
Genre Tritonilidia Odhner, 1934

Sous-famille Tritoniopsinae Eliot, 1907
Genre Tritoniopsis Eliot, 1907

Sous-famille Tritoniscinae Bergh, 1898
Genre Tritoniscus Bergh, 1898

Sous-famille Tritoniellinae Bergh, 1898
Genre Tritoniella Bergh, 1877

Sous-famille Tritoniidae Lamarck, 1809
Genre Tritonia Cuvier, 1803

Sous-famille Tritoniin

Hexabranchus is from Superfamily Doridoidea. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Superfamily Doridoidea. Hexabranchus is from Order Nudibranchia. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Order Nudibranchia. Hexabranchus is from Subclass Opisthobranchia. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Subclass Opisthobranchia. Hexabranchus is from Class Gastropoda. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Class Gastropoda. Hexabranchus is from Phylum Mollusca. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Phylum Mollusca. Hexabranchus is from Kingdom Animalia. To see its relatives, scientific classification and similar species, click on the Kingdom Animalia.

**Jet Green Hexabranchus sanguineus**
Scientific Classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Gastropoda
Subclass: Opisthobranchia
Order: Nudibranchia
Superfamily: Doridoidea
Family: Hexabranchidae
Genus: Hexabranchus
Species: H. sanguineus

Jet Green Hexabranchus sanguineus

Jet Green Hexabranchus sanguineus

Jet Green Hexabranchus

**Alicia de Tryon**
Nom latin
Nom commun
Famille : Nudibranches
Distribution : Philippines
Taille : 2 cm
Commentaire : Il a été découvert par Alicia de Tryon, d'où son nom. Il est très petit et très rare. Il a été découvert à Anilao aux Philippines. Il est très difficile à photographier car il est très petit et très rare. Il a été découvert à Anilao aux Philippines. Il est très difficile à photographier car il est très petit et très rare.

Alicia de Tryon, Anilao, Philippines, 2 cm

**Ange Lumineux**
Nom latin
Nom commun
Famille : Nudibranches
Distribution : Philippines
Taille : 2 cm
Commentaire : Il a été découvert par Alicia de Tryon, d'où son nom. Il est très petit et très rare. Il a été découvert à Anilao aux Philippines. Il est très difficile à photographier car il est très petit et très rare. Il a été découvert à Anilao aux Philippines. Il est très difficile à photographier car il est très petit et très rare.

Ange Lumineux

Total: 1 to 1 of 1
Page: 1 of 1
Per Page: 100 | 200 | 500 | All
Sort By: Name | Date Added | Date Modified
Switch To: Thumbnail | Image | Table

**Chromodoris annae**
Bergh, 1877
Nudibranchia : Doridina : Chromodorididae

Tylodina perversa, Rhodope Island, Halkidiki, Greece

**Tylodina perversa** (Gmelin, 1791)
Synonyme :
Tylodina citrina (Risso, 1818)
Tylodina fungina (Cantraine, 1835)
Tylodina gracilis (Risso, 1818)
Tylodina pallida (Risso, 1818)
Tylodina pallida (Risso, 1818)
Tylodina pallida

**Nudibranch - Chromodoris willani**

Taxonomie: Chromodoris willani
Taxonomy: Chromodoris willani

Taille: 4 cm
Size: 1.6 in

Répartition: Chromodoris willani est endémique de la mer Rouge.
Distribution: Chromodoris willani is endemic to the Red Sea.



Chromodoris willani, Nudibranche, Mer Rouge, Egypte
Chromodoris willani, Nudibranch, Red Sea, Egypt

**

**Cypraea tigris** Linnaeus 1758
**Cauris tigre**

Cypraeidae - Cypraeinae - Cypraea

Taxonomie : Cypraea tigris Linnaeus, 1758

Synonymes : Cypraea tigris var. citrina Lamarck, 1810 ; Cypraea tigris var. lutea Lamarck, 1810 ; Cypraea tigris var. rosea Lamarck, 1810 ; Cypraea tigris var. schilderorum Cate, 1973 ; Cypraea tigris var. tigris Linnaeus, 1758

Noms communs : Tiger Cowrie (en) ; Tijgerkauri (nl) ; Tigerkauri (de) ; Cauri tigre (fr) ; Cauri tigrado (es) ; Cauri tigrato (it) ; Cauri-tigre (pt) ; Tigerkaurischnecke (de) ; Tigerkauri (de) ; Tigerkauri (de) ; Tigerkauri

Fig. 1 - Dorsal view of *Chromodoris quadricolor* (Rüppell & Leuckart, 1830) - Egypt, Sharm el Sheikh, Ras Umm Sidr, 5 m, 2 Jun 2009 - Photo © Nudibranchs Foundation

**Chromodoris quadricolor**

**Ver Arqui**
*Arquitubulus* sp.
Annélides - Polychètes

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Tube calcaire droit ou légèrement courbé, ouvert aux deux extrémités, fixé sur un substrat dur. Ouverture antérieure avec un opercule calcaire à 2 valves. Corps mou du ver avec tentacules branchiaux pour la respiration et la capture de particules. Couleur du tube : blanc à gris.
Habitat: Fixé sur substrat dur, de la zone intertidale à 30 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique.
Comportement: Sédentaire, filtreur.
Reproduction: Ovipare.
Taille: Tube jusqu'à 5 cm.


Ver Arqui (*Arquitubulus* sp.) - Tube calcaire ouvert aux deux extrémités, fixé sur substrat dur. Ouverture antérieure avec opercule calcaire à 2 valves. Corps mou du ver avec tentacules branchiaux pour la respiration et la capture de particules. Couleur du tube : blanc à gris. - Tube jusqu'à 5 cm.

Voir Pinctada maxima

**Huître perlière dorée**
*Pinctada maxima*
Mollusques - Bivalves

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Grande huître nacrière, coquille épaisse, nacre argentée à dorée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun foncé à noirâtre, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs.
Habitat: Fixée par byssus sur substrat dur, de la zone intertidale à 70 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines.
Comportement: Filtreur, sédentaire.
Reproduction: Ovipare, fécondation externe.
Taille: Jusqu'à 30 cm.

Huître perlière dorée (*Pinctada maxima*) - Grande huître nacrière, coquille épaisse, nacre argentée à dorée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun foncé à noirâtre, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs. - Jusqu'à 30 cm.

Voir Pinctada margaritifera

**Huître perlière noire**
*Pinctada margaritifera*
Mollusques - Bivalves

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Grande huître nacrière, coquille épaisse, nacre argentée à noirâtre. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun foncé à noirâtre, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs.
Habitat: Fixée par byssus sur substrat dur, de la zone intertidale à 70 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines.
Comportement: Filtreur, sédentaire.
Reproduction: Ovipare, fécondation externe.
Taille: Jusqu'à 25 cm.

Huître perlière noire (*Pinctada margaritifera*) - Grande huître nacrière, coquille épaisse, nacre argentée à noirâtre. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun foncé à noirâtre, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs. - Jusqu'à 25 cm.

Voir Pinctada radiata

**Huître perlière radiée**
*Pinctada radiata*
Mollusques - Bivalves

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Huître nacrière de taille moyenne, coquille fine, nacre blanche à rosée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun clair à grisâtre avec stries radiales, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs.
Habitat: Fixée par byssus sur substrat dur, de la zone intertidale à 50 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique, Mer Rouge, Océan Indien, Asie du Sud-Est.
Comportement: Filtreur, sédentaire.
Reproduction: Ovipare, fécondation externe.
Taille: Jusqu'à 15 cm.

Huître perlière radiée (*Pinctada radiata*) - Huître nacrière de taille moyenne, coquille fine, nacre blanche à rosée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun clair à grisâtre avec stries radiales, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs. - Jusqu'à 15 cm.

Voir Pinctada fucata martensii

**Huître perlière de Martens**
*Pinctada fucata martensii*
Mollusques - Bivalves

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Huître nacrière de taille moyenne, coquille fine, nacre blanche à rosée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun clair à grisâtre avec stries radiales, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs.
Habitat: Fixée par byssus sur substrat dur, de la zone intertidale à 50 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique, Japon, Asie du Sud-Est.
Comportement: Filtreur, sédentaire.
Reproduction: Ovipare, fécondation externe.
Taille: Jusqu'à 15 cm.

Huître perlière de Martens (*Pinctada fucata martensii*) - Huître nacrière de taille moyenne, coquille fine, nacre blanche à rosée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun clair à grisâtre avec stries radiales, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs. - Jusqu'à 15 cm.

Voir Pinctada imbricata

**Huître perlière imbriquée**
*Pinctada imbricata*
Mollusques - Bivalves

Taxonomie: Ref. à valider
Description: Huître nacrière de taille moyenne, coquille fine, nacre blanche à rosée. Valves inégales, la supérieure plus plate. Byssus développé. Couleur externe brun clair à grisâtre avec stries radiales, nacre très brillante. Manteau avec tentacules sensoriels et yeux primitifs.
Habitat: Fixée par byssus sur substrat dur, de la zone intertidale à 50 m de profondeur.
Répartition: Indo-Pacifique, Mer Rouge, Océan Indien, Asie du Sud-Est.
Comportement: Filtreur, sédentaire.
Reproduction: Ovipare, fécondation externe.
Taille: Jusqu'à 15 cm.

Huître perlière imbriquée (*Pinctada imbricata

Coût: aucun / 0 pt.
Portée: 0 / Contact
Durée: Instantanée
Type: Magie

Le lanceur de sorts touche une cible et lui transmet une partie de sa force vitale. Il perd autant de points de vie que la cible en récupère. Si la cible est déjà à son maximum de points de vie, le lanceur ne perd aucun point de vie. Le lanceur ne peut pas se tuer lui-même avec ce sort.

Ce sort est souvent utilisé par les [[Nécromancie|nécromanciens]] pour soigner leurs [[Mort-vivant|morts-vivants]] et [[Démon|démons]] qui ont été blessés au combat.

Ce sort est également utilisé par les [[Prêtre|prêtres]]

Scorpion Tree Dragon, Lagerstätte de Hunsrück, Allemagne, Dévonien inférieur, 400 millions d'années

**Le Scorpion Tree Dragon** est un scorpion de Hunsrück, Allemagne, Dévonien inférieur, 400 millions d'années. Il est le plus grand scorpion de la Lagerstätte de Hunsrück. Il mesure 1,5 mètre de long. Il est le prédateur le plus dangereux de son écosystème. Il est le prédateur le plus dangereux de son époque. Il est le prédateur le plus dangereux de son époque. Il est le prédateur le plus dangereux de son époque

**Papinus princeps**
Simon, 1903
Taille mâle : 4 mm
Taille femelle : 4 mm
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Papinus ceylonicus* Simon, 1903 dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Sri Lanka
Publication originale : Simon E., 1903. Histoire naturelle des araignées. Paris, Roret, 1892-1903.

Papinus princeps, Sri Lanka, Simon, 1903 - Vue dorsale


Papinus princeps, Sri Lanka, Simon, 1903 - Vue ventrale

**Pelinobius muticus**
(Keyserling, 1877)
Taille mâle : 5 mm
Taille femelle : 5 mm
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Pelinobius bicolor* (Keyserling, 1877) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Publication originale : Keyserling E., 1877. Die Arachniden Australiens. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1877-1891.


Pelinobius muticus, Australie, Keyserling, 1877 - Vue dorsale


Pelinobius muticus, Australie, Keyserling, 1877 - Vue ventrale

**Pelinobius bicolor**
(Keyserling, 1877)
Taille mâle : 5 mm
Taille femelle : 5 mm
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Pelinobius muticus* (Keyserling, 1877) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Publication originale : Keyserling E., 1877. Die Arachniden Australiens. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1877-1891.


Pelinobius bicolor, Australie, Keyserling, 1877 - Vue dorsale


Pelinobius bicolor, Australie, Keyserling, 1877 - Vue ventrale

**Lycosa tarantula**
(Linnaeus, 1758)
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa narbonensis* Walckenaer, 1837 dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Linnaeus C., 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tome I, Editio decima, reformata. Holmiae, Laurentii Salvii, 1758.


Lycosa tarantula, Europe, Linnaeus, 1758 - Vue dorsale


Lycosa tarantula, Europe, Linnaeus, 1758 - Vue ventrale

**Lycosa narbonensis**
Walckenaer, 1837
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Walckenaer C. A., 1837. Tableau des aranéides ou caractère essentiels des tribus, genres, familles et races que renferme le genre Aranea de Linné, avec la description des espèces de chacune de ces divisions. Paris, Roret, 1837.


Lycosa narbonensis, Europe, Walckenaer, 1837 - Vue dorsale


Lycosa narbonensis, Europe, Walckenaer, 1837 - Vue ventrale

**Lycosa singoriensis**
(Laxmann, 1770)
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Laxmann E., 1770. Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten Spinnen. Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 14 : 561-586.


Lycosa singoriensis, Europe, Laxmann, 1770 - Vue dorsale


Lycosa singoriensis, Europe, Laxmann, 1770 - Vue ventrale

**Lycosa praegrandis**
Koch, 1878
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Koch L., 1878. Die Arachniden Australiens. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1877-1891.


Lycosa praegrandis, Europe, Koch, 1878 - Vue dorsale


Lycosa praegrandis, Europe, Koch, 1878 - Vue ventrale

**Lycosa pulla**
Koch, 1878
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Koch L., 1878. Die Arachniden Australiens. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1877-1891.


Lycosa pulla, Europe, Koch, 1878 - Vue dorsale


Lycosa pulla, Europe, Koch, 1878 - Vue ventrale

**Lycosa fasciiventris**
Nicolet, 1849
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Nicolet H., 1849. Recherches pour servir à l'histoire des Arachnides du Chili. Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, 3e série, 11 : 275-338.


Lycosa fasciiventris, Europe, Nicolet, 1849 - Vue dorsale


Lycosa fasciiventris, Europe, Nicolet, 1849 - Vue ventrale

**Lycosa erythrognatha**
Lucas, 1836
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Lucas H., 1836. Histoire naturelle des animaux articulés. Paris, Roret, 1836.


Lycosa erythrognatha, Europe, Lucas, 1836 - Vue dorsale


Lycosa erythrognatha, Europe, Lucas, 1836 - Vue ventrale

**Lycosa hispanica**
(Walckenaer, 1837)
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Walckenaer C. A., 1837. Tableau des aranéides ou caractère essentiels des tribus, genres, familles et races que renferme le genre Aranea de Linné, avec la description des espèces de chacune de ces divisions. Paris, Roret, 1837.


Lycosa hispanica, Europe, Walckenaer, 1837 - Vue dorsale


Lycosa hispanica, Europe, Walckenaer, 1837 - Vue ventrale

**Lycosa ingenua**
(Hentz, 1845)
Taille mâle : 30 pd.
Taille femelle : 30 pd.
Cymbiapophyse : Crochets : Stries :
Yeux : 8 : 4 : 4
Colulus : 0
Fovéa : 0
Pattes : 4 : 1 : 2 : 3
Formule : 4 1 2 3
Tibia I : 35 pd.
Tibia IV : 35 pd.
Cymbium : 0
Tégulum : 0
Apophyse tégulaire : 0
Apophyse bulbaire : 0
Embolus : 0
Conformation : Cette espèce est très proche de *Lycosa tarantula* (Linnaeus, 1758) dont elle se distingue par la forme de l'apophyse tégulaire.
Répartition : Europe, Afrique du Nord, Asie
Publication originale : Hentz N. M., 1845. Descriptions and figures of the spiders of the United States. Boston, Hilliard, Gray & Co., 1845.


Lycosa ingenua, Europe, Hentz, 1845 - Vue dorsale


Lycosa ingenua, Europe, Hentz, 1845

**NIDALIE**[1] **FLEUVE** (Nom : Nidalie, à l'Orique : nom de la fleur)

**LOUP-LUNE**
**Lycan Lunaire**



Loup-Lune, Lycan Lunaire, Nidalie, Fleuve, Oriques, Nuit, Lune, Pleine Lune, Lycanthrope

Lycan Lunaire en pleine Lune

**Loup Nocturne**
**Loup Lunaire**



Loup Nocturne, Loup Lunaire, Nidalie, Fleuve, Oriques, Nuit, Lune, Pleine Lune, Lycanthrope

Loup Nocturne en pleine Lune

**LOUP-LUNE**
**Lycan Lunaire**



Loup-Lune, Lycan Lunaire, Nidalie, Fleuve, Oriques, Nuit, Lune, Pleine Lune, Lycanthrope

Lycan Lunaire

Homard européen (Homarus gammarus) - Mer Noire, Bulgarie

Homard à doigts longs (Nephrops norvegicus)

Longueur totale : 25 cm
Profondeur : 0 à 800 m
Température : 2 à 12 °C
Salinité : 30 à 38 ‰
Habitat : Fonds meubles de vase ou de sable fin, entre 0 et 800 m de profondeur. Il creuse des terriers dans la vase et y vit en groupe.
Répartition : Atlantique Est, de la Norvège au Maroc, Méditerranée, Mer Noire.
Alimentation : Il se nourrit de petits poissons, de crustacés et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 9 à 10 mois.
Comportement : Il est actif la nuit et passe la journée caché dans son terrier.
Prédateurs : Il est chassé par les grands poissons et les humains.

Homard à doigts longs (Nephrops norvegicus) - Mer Noire, Bulgarie

Homard nain (Homarus minor)

Longueur totale : 15 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 10 à 25 °C
Salinité : 35 à 38 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Est, de la Mauritanie au Sénégal, Îles Canaries, Îles du Cap-Vert.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard nain (Homarus minor) - Îles Canaries, Espagne

Homard des Caraïbes (Panulirus argus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 100 m
Température : 20 à 30 °C
Salinité : 35 à 38 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 100 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Caraïbes, Floride, Bermudes, Antilles.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard des Caraïbes (Panulirus argus) - Îles Caïmans

Homard européen (Homarus gammarus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 5 à 15 °C
Salinité : 35 à 38 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Est, de la Norvège au Maroc, Méditerranée, Mer Noire.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard européen (Homarus gammarus) - Mer Noire, Bulgarie

Homard américain (Homarus americanus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 5 à 15 °C
Salinité : 30 à 35 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Nord-Ouest, de Terre-Neuve à la Caroline du Nord.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard américain (Homarus americanus) - Terre-Neuve, Canada

Homard européen (Homarus gammarus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 5 à 15 °C
Salinité : 35 à 38 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Est, de la Norvège au Maroc, Méditerranée, Mer Noire.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard européen (Homarus gammarus) - Mer Noire, Bulgarie

Homard américain (Homarus americanus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 5 à 15 °C
Salinité : 30 à 35 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Nord-Ouest, de Terre-Neuve à la Caroline du Nord.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard américain (Homarus americanus) - Terre-Neuve, Canada

Homard européen (Homarus gammarus)

Longueur totale : 60 cm
Profondeur : 0 à 200 m
Température : 5 à 15 °C
Salinité : 35 à 38 ‰
Habitat : Fonds rocheux et coralliens, entre 0 et 200 m de profondeur. Il se cache dans les anfractuosités et les crevasses.
Répartition : Atlantique Est, de la Norvège au Maroc, Méditerranée, Mer Noire.
Alimentation : Il se nourrit de petits crustacés, de vers et de mollusques.
Reproduction : Les femelles portent les œufs sous leur abdomen pendant 3 à 4 semaines.
Comportement : Il est discret et vit caché dans les anfractuosités des rochers.
Prédateurs : Il est chassé par les poissons prédateurs et les humains.

Homard européen (Homarus gammarus) - Mer Noire, Bulgarie

Nous faisons quelques sorties dans la matinée. Elle se caractérise par peu de courant, excellente vis-à-vis, et une température de l'eau à 28°C. Nous sommes accompagnés par Jean-Marc, Moniteur, Guide, Directeur de plongée.



**Gili petit Air**
**Crapaud Japonais**
Lophiomus setigerus
Famille : Ogcocephalidae
Ordre : Lophiiformes
Classe : Actinopterygii
Taille : 15 cm
Poids : 1 kg
Profondeur : 0 à 30 m
Habitat : Récifs coralliens, Sable
Régime : Poissons, crustacés
Reproduction : Ovipare

Gili Petit Air

Gili Petit Air

Gili Petit Air

Le requin Baleine ou requin pélerin (Cetorhinus maximus) est un requin tapissier de la famille des Cetorhinidae. Il est le deuxième plus grand poisson au monde après le requin-baleine. Il peut atteindre 15 m de long et peser 7 tonnes. Il est inoffensif pour l'homme.

Son habitat favori est la mer Rouge et l'océan Indien, Madagascar, les Seychelles, Australie, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Tanzanie.

Requin baleine (Rhincodon typus) - Photo : Richard Ellis

**requin-lime** (Negaprion brevirostris)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-lime du Pacifique** (Negaprion acutidens)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Pacifique

Requin-lime (Negaprion brevirostris) - Photo : Terry Goss

**requin-lime des Caraïbes** (Negaprion fowleri)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Atlantique

**requin-pèlerin** (Cetorhinus maximus)
Famille : Cetorhinidae
Ordre : Lamniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 15 m
Poids : 7 000 kg
Espérance de vie : 50 années
Régime : Plancton
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) - Photo : Terry Goss

**requin-baleine** (Rhincodon typus)
Famille : Rhincodontidae
Ordre : Orectolobiformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 18 m
Poids : 34 000 kg
Espérance de vie : 70 années
Régime : Plancton, petits poissons
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin baleine (Rhincodon typus) - Photo : Richard Ellis

**requin-taupe bleu** (Isurus oxyrinchus)
Famille : Lamnidae
Ordre : Lamniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 4 m
Poids : 450 kg
Espérance de vie : 30 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus) - Photo : Terry Goss

**requin-taupe commun** (Lamna nasus)
Famille : Lamnidae
Ordre : Lamniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin taupe commun (Lamna nasus) - Photo : Terry Goss

Le requin-taupe commun est un requin de la famille des Lamnidae. Il peut atteindre 3 m de long et peser 230 kg. Il est inoffensif pour l'homme.

Son habitat favori est la mer Rouge et l'océan Indien, Madagascar, les Seychelles, Australie, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Tanzanie.

Voir aussi : requin-taupe bleu, requin-taupe commun et requin-taupe de Californie.

**requin-taupe de Californie** (Lamna ditropis)
Famille : Lamnidae
Ordre : Lamniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Pacifique

Requin taupe de Californie (Lamna ditropis) - Photo : Terry Goss

**requin-nourrice** (Ginglymostoma cirratum)
Famille : Ginglymostomatidae
Ordre : Orectolobiformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 4 m
Poids : 450 kg
Espérance de vie : 30 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin nourrice (Ginglymostoma cirratum) - Photo : Terry Goss

**requin-nourrice Tawny** (Nebrius ferrugineus)
Famille : Ginglymostomatidae
Ordre : Orectolobiformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 4 m
Poids : 450 kg
Espérance de vie : 30 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

Requin nourrice Tawny (Nebrius ferrugineus) - Photo : Terry Goss

Le requin nourrice Tawny (Nebrius ferrugineus) est un requin de la famille des Ginglymostomatidae. Il peut atteindre 4 m de long et peser 450 kg. Il est inoffensif pour l'homme.

Son habitat favori est la mer Rouge et l'océan Indien, Madagascar, les Seychelles, Australie, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Tanzanie.

Voir aussi : requin-nourrice et requin-nourrice Tawny.

**requin-bouledogue** (Carcharhinus leucas)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

Requin bouledogue (Carcharhinus leucas) - Photo : Terry Goss

Le requin-bouledogue est un requin de la famille des Carcharhinidae. Il peut atteindre 3 m de long et peser 230 kg. Il est inoffensif pour l'homme.

Son habitat favori est la mer Rouge et l'océan Indien, Madagascar, les Seychelles, Australie, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Tanzanie.

**requin-bouledogue de Fowler** (Carcharhinus fowleri)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique, Océan Atlantique

**requin-bouledogue de Galapagos** (Carcharhinus galapagensis)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Pacifique

**requin-bouledogue de Sumatra** (Carcharhinus sumatranus)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue de Taylor** (Carcharhinus tilstoni)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue de Whitney** (Carcharhinus whitneyi)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis gangeticus)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis glyphis)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis siamensis)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species A)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species B)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species C)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species D)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species E)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species F)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species G)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species H)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species I)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species J)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species K)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species L)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species M)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species N)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species O)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species P)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species Q)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species R)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species S)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species T)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species U)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species V)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species W)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species X)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species Y)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species Z)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AA)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AB)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AC)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AD)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AE)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AF)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AG)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AH)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AI)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AJ)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AK)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AL)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AM)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AN)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AO)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AP)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AQ)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AR)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AS)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AT)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AU)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AV)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AW)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AX)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AY)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species AZ)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BA)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BB)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BC)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BD)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BE)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BF)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BG)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BH)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BI)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BJ)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BK)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BL)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BM)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BN)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BO)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BP)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3 m
Poids : 230 kg
Espérance de vie : 25 années
Régime : Poissons, céphalopodes
Habitat : Océan
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique

**requin-bouledogue du Gange** (Glyphis species BQ)
Famille : Carcharhinidae
Ordre : Carcharhiniformes
Classe : Chondrichthyes
Embranchement : Vertébrés
Règne : Animaux
Taille : 3

**gobie de Jay Bragg**
**Priolepis jaybragg**

Taxonomie: Priolepis jaybragg
Famille: Gobiidae
Ordre: Perciformes
Classe: Actinopterygii
Embranchement: Chordata
Règne: Animalia

Long à 5 mm à 6 cm Taille : 10 cm Eau douce, Saumâtre, Marine, Eau de mer, Eau de mer artificielle, Aquarium d'Eau douce, Aquarium d'Eau de mer, Aquarium d'Eau saumâtre, Aquarium d'

Aeo Pacifique - Indonésie - Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe à bec court**
*Hippocampus denise*
Lourdeau, 2005

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Indonésie - Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe barbu**
*Hippocampus barbiganus*
Weber, 1913

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe de Fisher**
*Hippocampus fisheri*
Jordan & Evermann, 1903

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe de Kuda**
*Hippocampus kuda*
Bleeker, 1852

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe de Satomi**
*Hippocampus satomiae*
Lourdeau, 2005

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe à tête de cheval**
*Hippocampus kelloggi*
Jordan & Snyder, 1901

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe à tête de cheval**
*Hippocampus kelloggi*
Jordan & Snyder, 1901

Taille : 15 cm
Nombre de rayons de la nageoire dorsale : 17 à 18
Nombre de rayons de la nageoire pectorale : 15 à 16
Nombre de rayons de la nageoire anale : 4
Nombre d'anneaux : 11 + 34 à 36
Hippocampe d'un vert tirant parfois sur le jaune, avec des taches blanches et des petites épines sur le corps. Il a un museau court et un coronet bas. Il vit dans les eaux peu profondes, jusqu'à 30 m de profondeur, sur des fonds de sable, de vase ou de débris coquilliers, parfois près des récifs coralliens.

Aeo Pacifique - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande et Viet Nam

**Hippocampe à museau court**
*Hippocampus denise*
Lourdeau, 2005

**Chromis viridis**
**(Cuvier, 1830)**
Chromis à deux taches

Chromis viridis (Cuvier, 1830)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale vert pâle à jaune. Une tache noire sur les côtés du corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Dascyllus aruanus**
**(Linnaeus, 1758)**
Dascyllus à queue blanche

Dascyllus aruanus (Linnaeus, 1758)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Nageoire caudale blanche. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Dascyllus trimaculatus**
**(Rüppell, 1829)**
Dascyllus à trois taches

Dascyllus trimaculatus (Rüppell, 1829)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Nageoire caudale blanche. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire. Présence de 3 taches blanches sur le corps : une sur le front, une sur le milieu du corps et une sur le pédoncule caudal.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Dascyllus reticulatus**
**(Richardson, 1846)**
Dascyllus à damier

Dascyllus reticulatus (Richardson, 1846)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Nageoire caudale blanche. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire. Présence de 3 taches blanches sur le corps : une sur le front, une sur le milieu du corps et une sur le pédoncule caudal.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Dascyllus strasburgi**
**(Klausewitz, 1960)**
Dascyllus de Strasburg

Dascyllus strasburgi (Klausewitz, 1960)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Nageoire caudale blanche. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire. Présence de 3 taches blanches sur le corps : une sur le front, une sur le milieu du corps et une sur le pédoncule caudal.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Dascyllus trimaculatus**
**(Rüppell, 1829)**
Dascyllus à trois taches

Dascyllus trimaculatus (Rüppell, 1829)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 10 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale fourchue. Nageoire dorsale continue. Nageoire anale avec 2 épines et 12 à 13 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Nageoire caudale blanche. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire. Présence de 3 taches blanches sur le corps : une sur le front, une sur le milieu du corps et une sur le pédoncule caudal.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.



**Amphiprion clarkii**
**(Bennett, 1830)**
Amphiprion de Clark

Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale jaune à orange. Présence de 3 bandes blanches sur le corps : une sur la tête, une sur le milieu du corps et une sur le pédoncule caudal. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion frenatus**
**(Brevoort, 1856)**
Amphiprion à bande rouge

Amphiprion frenatus (Brevoort, 1856)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande rouge sur le corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion perideraion**
**(Bleeker, 1855)**
Amphiprion à selle

Amphiprion perideraion (Bleeker, 1855)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande blanche sur le corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion sandaracinos**
**(Allen, 1972)**
Amphiprion de Allen

Amphiprion sandaracinos (Allen, 1972)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande blanche sur le corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion akallopisos**
**(Bleeker, 1853)**
Amphiprion à bande blanche

Amphiprion akallopisos (Bleeker, 1853)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande blanche sur le corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion chrysopterus**
**(Cuvier, 1830)**
Amphiprion à nageoires jaunes

Amphiprion chrysopterus (Cuvier, 1830)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande blanche sur le corps. Nageoires pectorales jaunes. Nageoires pelviennes noires. Nageoire anale avec une bordure noire.

Habitat : Récifs coralliens, lagons, pentes externes. Entre 1 et 30 m de profondeur.

Répartition : Océan Indien et Pacifique ouest.

Observations : Espèce très commune dans les zones peu profondes. Vit en petits groupes.

**Amphiprion ocellaris**
**(Cuvier, 1830)**
Amphiprion ocellaris

Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830)

Taxonomie : Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae

Longueur maximale : 15 cm

Description : Corps ovale et comprimé. Nageoire caudale arrondie. Nageoire dorsale continue avec 10 épines et 15 à 17 rayons mous. Nageoire anale avec 2 épines et 13 à 14 rayons mous. Nageoires pectorales arrondies. Nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Ligne latérale interrompue. Couleur générale noire. Présence d'une bande blanche

**Centropyge bicolor**
**Centropyge bicolore**
Nom anglais : Bicolor Angelfish
Famille : Pomacanthidae
Taille : 15 cm
Poids : 0.1 kg
Température : 22 - 28 °C
Origine : Océan Indien, Océan Pacifique
Habitat : Récifs coralliens
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ponte
Description : Le bicolore angelfish a un corps de forme ovale et comprimé latéralement. Il mesure environ 15 cm maximum. Il est de couleur jaune vif sur la partie antérieure du corps et bleu foncé sur la partie postérieure. Il a une nageoire caudale arrondie. Les nageoires dorsale et anale sont bleu foncé. Les nageoires pectorales sont jaunes. Les nageoires ventrales sont bleues. Les yeux sont entourés d'un anneau bleu. Il a une petite bouche avec des dents en forme de brosse. Il a une ligne latérale. Il a 14 épines et 17 à 19 rayons à la nageoire dorsale. Il a 3 épines et 16 à 18 rayons à la nageoire anale. Il a 17 rayons à la nageoire pectorale. Il a 1 épine et 5 rayons à la nageoire ventrale. Il a 13 à 15 rayons à la nageoire caudale. Il a 34 à 36 vertèbres.
Comportement : Le bicolore angelfish vit en solitaire, en paire ou en petit groupe. Il se nourrit principalement de petites éponges, de tuniciers, de cnidaires, de polychètes, de petits crustacés et de petits mollusques. Il broute également des algues. Il se nourrit également de zooplancton. Il est diurne. Il est territorial. Il peut être agressif envers les autres poissons. Il peut être agressif envers les autres individus de son espèce. Il peut être agressif envers les individus de son espèce. Il peut être agressif envers les individus de son espèce. Il peut être agressif envers les

Taxon: Pomacanthus annularis

Famille: Pomacanthidae

Synonyme: Chaetodon annularis

Nom commun: Poisson-ange annulaire

Nom commun: Annular Angelfish

Nom commun: Ringed Angelfish

Nom commun: Blue Ring Angelfish

Nom commun: Ringed Angel

Nom commun: Poisson-ange bleu

Nom commun: Blue Angelfish

Nom commun: Poisson-ange d'Arabie

Nom commun: Arabian Angelfish

Nom commun: Poisson-ange d'Indonésie

Nom commun: Indonesian Angelfish

Nom commun: Poisson-ange de Sumatra

Nom commun: Sumatran Angelfish

Nom commun: Poisson-ange de Thaïlande

Nom commun: Thailand Angelfish

Nom commun: Poisson-ange de Vietnam

Nom commun: Vietnam Angelfish

Nom commun: Poisson-ange de Zanzibar

Nom commun: Zanzibar Angelfish

Nom commun: Poisson-ange des Philippines

Nom commun: Philippine Angelfish

Nom commun: Poisson-ange du Sri Lanka

Nom commun: Sri Lanka Angelfish

Nom commun: Poisson-ange du Sud-Est asiatique

Nom commun: Southeast Asian

**Acanthurus coeruleus**
Bloch & Schneider, 1801
Common name: Blue tang
Taille maximum: 60 cm
Poids maximum: 3.6 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus caeruleus Bloch & Schneider, 1801


Blue Tang - Acanthurus coeruleus

**Acanthurus chirurgus**
(Bloch, 1787)
Common name: Doctorfish
Taille maximum: 38 cm
Poids maximum: 1.5 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)


Doctorfish - Acanthurus chirurgus

**Acanthurus tractus**
Poey, 1860
Common name: Ocean surgeon
Taille maximum: 38 cm
Poids maximum: 1.5 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus tractus Poey, 1860


Ocean Surgeon - Acanthurus tractus

**Acanthurus triostegus**
(Linnaeus, 1758)
Common name: Convict tang
Taille maximum: 20 cm
Poids maximum: 0.3 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)


Convict Tang - Acanthurus triostegus

**Acanthurus tropicus**
Randall & Klausewitz, 1973
Common name: Blue tang
Taille maximum: 60 cm
Poids maximum: 3.6 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus tropicus Randall & Klausewitz, 1973


Blue Tang - Acanthurus tropicus

**Acanthurus xanthopterus**
Valenciennes, 1835
Common name: Yellowfin surgeonfish
Taille maximum: 70 cm
Poids maximum: 4.5 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835


Yellowfin Surgeonfish - Acanthurus xanthopterus

**Achirus lineatus**
(Linnaeus, 1758)
Common name: Lined sole
Taille maximum: 25 cm
Poids maximum: 0.3 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)


Lined Sole - Achirus lineatus

**Acropora cervicornis**
(Lamarck, 1816)
Common name: Staghorn coral
Taille maximum: 200 cm
Poids maximum: 10 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acropora cervicornis (Lamarck, 1816)


Staghorn Coral - Acropora cervicornis

**Acropora palmata**
(Lamarck, 1816)
Common name: Elkhorn coral
Taille maximum: 200 cm
Poids maximum: 10 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Acropora palmata (Lamarck, 1816)


Elkhorn Coral - Acropora palmata

**Actinia equina**
(Linnaeus, 1758)
Common name: Beadlet anemone
Taille maximum: 10 cm
Poids maximum: 0.1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinia equina (Linnaeus, 1758)


Beadlet Anemone - Actinia equina

**Actinia fragacea**
(Tugwell, 1856)
Common name: Strawberry anemone
Taille maximum: 5 cm
Poids maximum: 0.05 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinia fragacea (Tugwell, 1856)


Strawberry Anemone - Actinia fragacea

**Actinia tenebrosa**
Farquhar, 1895
Common name: Waratah anemone
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinia tenebrosa Farquhar, 1895


Waratah Anemone - Actinia tenebrosa

**Actinia viridis**
(Linnaeus, 1758)
Common name: Green anemone
Taille maximum: 10 cm
Poids maximum: 0.1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinia viridis (Linnaeus, 1758)


Green Anemone - Actinia viridis

**Actinodendron arboreum**
Quoy & Gaimard, 1833
Common name: Tree anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinodendron arboreum Quoy & Gaimard, 1833


Tree Anemone - Actinodendron arboreum

**Actinoporus elegans**
Carlgren, 1900
Common name: Elegant anemone
Taille maximum: 10 cm
Poids maximum: 0.1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinoporus elegans Carlgren, 1900


Elegant Anemone - Actinoporus elegans

**Actinostola chilensis**
Hertwig, 1882
Common name: Chilean anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola chilensis Hertwig, 1882


Chilean Anemone - Actinostola chilensis

**Actinostola crassicornis**
(Hertwig, 1882)
Common name: Thick-horned anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola crassicornis (Hertwig, 1882)


Thick-horned Anemone - Actinostola crassicornis

**Actinostola faurei**
Carlgren, 1931
Common name: Faure's anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola faurei Carlgren, 1931


Faure's Anemone - Actinostola faurei

**Actinostola gemmipara**
Carlgren, 1900
Common name: Gem-bearing anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola gemmipara Carlgren, 1900


Gem-bearing Anemone - Actinostola gemmipara

**Actinostola georgiana**
Carlgren, 1927
Common name: Georgia anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola georgiana Carlgren, 1927


Georgia Anemone - Actinostola georgiana

**Actinostola incerta**
Carlgren, 1900
Common name: Uncertain anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola incerta Carlgren, 1900


Uncertain Anemone - Actinostola incerta

**Actinostola pacifica**
Carlgren, 1900
Common name: Pacific anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola pacifica Carlgren, 1900


Pacific Anemone - Actinostola pacifica

**Actinostola spetsbergensis**
Carlgren, 1900
Common name: Spitsbergen anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola spetsbergensis Carlgren, 1900


Spitsbergen Anemone - Actinostola spetsbergensis

**Actinostola tenuis**
Carlgren, 1900
Common name: Thin anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola tenuis Carlgren, 1900


Thin Anemone - Actinostola tenuis

**Actinostola verrucosa**
Carlgren, 1900
Common name: Warty anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola verrucosa Carlgren, 1900


Warty Anemone - Actinostola verrucosa

**Actinostola vestita**
Carlgren, 1900
Common name: Clothed anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola vestita Carlgren, 1900


Clothed Anemone - Actinostola vestita

**Actinostola viridis**
Carlgren, 1900
Common name: Green anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola viridis Carlgren, 1900


Green Anemone - Actinostola viridis

**Actinostola vitrea**
Carlgren, 1900
Common name: Glass anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola vitrea Carlgren, 1900


Glass Anemone - Actinostola vitrea

**Actinostola vivipara**
Carlgren, 1900
Common name: Viviparous anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola vivipara Carlgren, 1900


Viviparous Anemone - Actinostola vivipara

**Actinostola wandeli**
Carlgren, 1900
Common name: Wandel's anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola wandeli Carlgren, 1900


Wandel's Anemone - Actinostola wandeli

**Actinostola zealandica**
Carlgren, 1900
Common name: New Zealand anemone
Taille maximum: 15 cm
Poids maximum: 0.2 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Actinostola zealandica Carlgren, 1900


New Zealand Anemone - Actinostola zealandica

**Aetobatus narinari**
(Euphrasen, 1790)
Common name: Spotted eagle ray
Taille maximum: 300 cm
Poids maximum: 230 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)


Spotted Eagle Ray - Aetobatus narinari

**Agaricia agaricites**
(Pallas, 1766)
Common name: Lettuce coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia agaricites (Pallas, 1766)


Lettuce Coral - Agaricia agaricites

**Agaricia fragilis**
Dana, 1846
Common name: Fragile saucer coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia fragilis Dana, 1846


Fragile Saucer Coral - Agaricia fragilis

**Agaricia humilis**
Verrill, 1901
Common name: Low-growing lettuce coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia humilis Verrill, 1901


Low-growing Lettuce Coral - Agaricia humilis

**Agaricia lamarcki**
Milne Edwards & Haime, 1851
Common name: Lamarck's sheet coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia lamarcki Milne Edwards & Haime, 1851


Lamarck's Sheet Coral - Agaricia lamarcki

**Agaricia tenuifolia**
Dana, 1846
Common name: Thin-leaf lettuce coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia tenuifolia Dana, 1846


Thin-leaf Lettuce Coral - Agaricia tenuifolia

**Agaricia undata**
(Ellis & Solander, 1786)
Common name: Ruffled lettuce coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia undata (Ellis & Solander, 1786)


Ruffled Lettuce Coral - Agaricia undata

**Agaricia undata undata**
(Ellis & Solander, 1786)
Common name: Ruffled lettuce coral
Taille maximum: 30 cm
Poids maximum: 1 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Distribution: Atlantique ouest: Floride, Bermudes, Bahamas, Caraïbes, Antilles, Brésil.
Habitat: Récifs coralliens, lagons, estuaires.
Comportement: Grégaire, diurne, herbivore.
Reproduction: Ponte pélagique.
Intérêt: Pêche commerciale, aquariophilie.
Observations: Peut changer de couleur pour se camoufler.
Synonyme: Agaricia undata undata (Ellis & Solander, 1786)


Ruffled Lettuce Coral - Agaricia undata

**apogon bleu**
**apogon cyanosoma**
commentaire : Apogon cyanosoma
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon cyanosoma est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon cyanosoma, Apogon bleu

**apogon à trois lignes**
**apogon trilineatus**
commentaire : Apogon trilineatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon trilineatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon trilineatus, Apogon à trois lignes

**apogon**
**apogon maculatus**
commentaire : Apogon maculatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon maculatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon maculatus, Apogon à deux taches

**apogon rayé**
**apogon quadrisquamatus**
commentaire : Apogon quadrisquamatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon quadrisquamatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon quadrisquamatus, Apogon rayé

**apogon tigré**
**apogon pseudomaculatus**
commentaire : Apogon pseudomaculatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon pseudomaculatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon pseudomaculatus, Apogon tigré

**apogon à tache noire**
**apogon aurolineatus**
commentaire : Apogon aurolineatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon aurolineatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon aurolineatus, Apogon à tache noire

**apogon à deux taches**
**apogon binotatus**
commentaire : Apogon binotatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon binotatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon binotatus, Apogon à deux taches

**apogon à deux bandes**
**apogon townsendi**
commentaire : Apogon townsendi
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon townsendi est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon townsendi, Apogon à deux bandes

**apogon à deux raies**
**apogon lineatus**
commentaire : Apogon lineatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon lineatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon lineatus, Apogon à deux raies

**apogon à deux lignes**
**apogon pseudomaculatus**
commentaire : Apogon pseudomaculatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon pseudomaculatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon pseudomaculatus, Apogon à deux lignes

**apogon à deux bandes noires**
**apogon fasciatus**
commentaire : Apogon fasciatus
Taille : 10 cm
Poids : 20 g
Longévité : 5 ans
Température : 24 à 28°C
Origine : Caraïbes
Alimentation : Omnivore
Comportement : Apogon fasciatus est un poisson grégaire qui vit en petits groupes dans les récifs et les herbiers peu profonds. Il est nocturne et se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton. Il est ovipare et les mâles incubent les œufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion des larves. Bonne eau claire, bonne filtration, bonne oxygénation. Ne pas mettre avec des poissons trop petits qui pourraient être mangés. Ne pas mettre avec des poissons trop agressifs qui pourraient le harceler.


Apogon fasciatus, Apogon à deux bandes noires

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

Poissons de Polynésie

**vieille à capuchon jaune**
**Bodianus axillaris**



Famille : Labridae
Taille : 30 cm
Poids : 0.5 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : Récifs coralliens, Récifs rocheux, Lagons
Comportement : Solitaire, Diurne
Régime : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Description : Corps jaune avec une tache noire sur la nageoire dorsale. Tête et nageoires caudale et pectorales jaunes. Juvénile rouge avec une tache noire sur la nageoire dorsale.



Vieille à capuchon jaune - Bodianus axillaris - Yellowhead Wrasse - Yellowhead Wrasse

**poisson-oiseau à bec noir**
**Epibulus insidiator**



Famille : Labridae
Taille : 40 cm
Poids : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : Récifs coralliens, Récifs rocheux, Lagons
Comportement : Solitaire, Diurne
Régime : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Description : Corps jaune avec une tache noire sur la nageoire dorsale. Tête et nageoires caudale et pectorales jaunes. Juvénile rouge avec une tache noire sur la nageoire dorsale.



Poisson-oiseau à bec noir - Epibulus insidiator - Slingjaw Wrasse - Slingjaw Wrasse

**poisson-oiseau à poudre jaune**
**Epibulus insidiator**



Famille : Labridae
Taille : 40 cm
Poids : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : Récifs coralliens, Récifs rocheux, Lagons
Comportement : Solitaire, Diurne
Régime : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Description : Corps jaune avec une tache noire sur la nageoire dorsale. Tête et nageoires caudale et pectorales jaunes. Juvénile rouge avec une tache noire sur la nageoire dorsale.



Poisson-oiseau à poudre jaune - Epibulus insidiator - Slingjaw Wrasse - Slingjaw Wrasse

**coris à bande jaune**
**Coris gaimard**



Famille : Labridae
Taille : 30 cm
Poids : 0.5 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : Récifs coralliens, Récifs rocheux, Lagons
Comportement : Solitaire, Diurne
Régime : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Description : Corps jaune avec une tache noire sur la nageoire dorsale. Tête et nageoires caudale et pectorales jaunes. Juvénile rouge avec une tache noire sur la nageoire dorsale.



Coris à bande jaune - Coris gaimard - Yellowtail Coris - Yellowtail Coris

**saint-cyran's three**
**Chaetodon paucifasciatus**
Lacepède, 1803

Taxonomie | Biologie | Habitat | Aquariophilie | Liens | Bibliographie

Taxonomie

Classification selon Nelson (2006) :
Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Sous-embranchement : Craniata
Infra-embranchement : Vertebrata
Classe : Actinopterygii
Sous-classe : Neopterygii
Infra-classe : Teleostei
Super-ordre : Acanthopterygii
Ordre : Perciformes
Sous-ordre : Percoidei
Famille : Chaetodontidae
Genre : Chaetodon
Espèce : Chaetodon paucifasciatus

Noms vernaculaires : Saint-Cyran's Butterflyfish (anglais), Saint-Cyran's Three-banded Butterflyfish (anglais), Saint-Cyran's Three-banded Butterflyfish (anglais), Saint-Cyran's Three-banded

**Genicanthus melanospilos** Burgess, 1977
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Blackspot
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus personatus** Randall, 1975
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Masked
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus semifasciatus** Kamohara, 1958
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Black-and-white
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus spinus** Allen & Steene, 1988
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Spiny
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus stenotaenia** Randall, 1975
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Narrow-barred
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus watanabei** Yasuda, Kamohara & Kitamura, 1976
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Watanabe's
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus whitleyi** Allen & Steene, 1988
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Whitley's
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus woodi** Fraser & Randall, 1983
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Wood's
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus zonatus** Randall, 1975
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Zonate
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet.
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Mozambique)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Mozambique)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Philippines)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Philippines)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Polynésie française)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Polynésie française)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Taïwan)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Taïwan)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Tonga)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Tonga)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Vanuatu)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Vanuatu)
Taille : 20 cm
Poids : 0.3 kg
Profondeur : 1 - 30 m
Habitat : récifs coralliens
Régime : planctonophage
Comportement : solitaire, en couple ou en groupe
Reproduction : ovipare
Description : Mâle : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Femelle : noire avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Juvénile : noir avec une bande blanche verticale sur le milieu du corps et une autre sur la queue. Le mâle et la femelle ont des taches blanches sur la tête et le corps. Le juvénile a des taches blanches sur la tête et le corps et une bande blanche sur la queue.
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa, Polynésie française, Hawaï

**Genicanthus** sp. indet. (Wallis et Futuna)
Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges)
Nom commun : Angelfish, Unidentified (Wallis et Futuna

Pour les curieux, un article sur le
Zebrasoma desjardinii (Bennett, 1828)
Zebrasoma desjardinii (Bennett, 1828)
Zebrasoma desjardinii (Bennett, 1828)

**Zebrasoma xanthurum**
Purple tang
Taille maximum : 41 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma xanthurum, Aquarium de Genève

**Zebrasoma gemmatum**
Spotted tang
Taille maximum : 20 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma gemmatum, Aquarium de Genève

**Zebrasoma veliferum**
Pacific sailfin tang
Taille maximum : 40 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma veliferum, Aquarium de Genève

**Zebrasoma desjardinii**
Red Sea sailfin tang
Taille maximum : 40 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma desjardinii, Aquarium de Genève

**Zebrasoma scopas**
Brown tang
Taille maximum : 40 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma scopas, Aquarium de Genève

**Zebrasoma rostratum**
Longnose tang
Taille maximum : 30 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma rostratum, Aquarium de Genève

**Zebrasoma flavescens**
Yellow tang
Taille maximum : 20 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma flavescens, Aquarium de Genève

**Zebrasoma xanthurum**
Purple tang
Taille maximum : 41 cm
Poids maximum : 1 kg
Profondeur : 1 - 40 m
Climat : tropical
Comportement grégaire : peu grégaire
Régime alimentaire : herbivore
Température : 22 - 28 °C
Dureté : 8 - 12 dGH
pH : 8.1 - 8.4
Densité : 1.020 - 1.025
Aquarium : 400 litres
Reproduction : ovipare
Sexe : dimorphisme sexuel inconnu
Famille : Acanthuridae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Zebrasoma xanthurum

La Perche de Mer (ou Perche de Lune) est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 60 cm de long et 2,5 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Perche de Lune Rouge de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses twistii**
Labroides Bleeker 1851 - Labridae





Taille maximale : 15 cm
Poids maximal : 50 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Jaune est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus petites, atteignant 15 cm de long et 50 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Jaune de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses viridis**
Cuvier 1830 - Labridae





Taille maximale : 40 cm
Poids maximal : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Vert Tacheté est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 40 cm de long et 1 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Vert Tacheté de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses caeruleopunctatus**
Lacepède 1801 - Labridae





Taille maximale : 20 cm
Poids maximal : 100 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Pointillés est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus petites, atteignant 20 cm de long et 100 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Pointillés de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses melanurus**
Bleeker 1857 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses meleagrides**
Cuvier 1830 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses neoguinaicus**
Bleeker 1878 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses twistii**
Labroides Bleeker 1851 - Labridae





Taille maximale : 15 cm
Poids maximal : 50 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Jaune est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus petites, atteignant 15 cm de long et 50 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Jaune de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses viridis**
Cuvier 1830 - Labridae





Taille maximale : 40 cm
Poids maximal : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Vert Tacheté est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 40 cm de long et 1 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Vert Tacheté de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses caeruleopunctatus**
Lacepède 1801 - Labridae





Taille maximale : 20 cm
Poids maximal : 100 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Pointillés est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus petites, atteignant 20 cm de long et 100 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Pointillés de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses melanurus**
Bleeker 1857 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses meleagrides**
Cuvier 1830 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Anampses neoguinaicus**
Bleeker 1878 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Labre Bleu à Queue Noire est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Labre Bleu à Queue Noire de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Aulostomus chinensis**
Linnaeus 1766 - Aulostomidae





Taille maximale : 80 cm
Poids maximal : 2 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Trompette de Chine est l'une des espèces les plus colorées de la famille Aulostomidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 80 cm de long et 2 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Trompette de Chine de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Aulostomus maculatus**
Valenciennes 1837 - Aulostomidae





Taille maximale : 80 cm
Poids maximal : 2 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Trompette de Chine est l'une des espèces les plus colorées de la famille Aulostomidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 80 cm de long et 2 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Trompette de Chine de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Aulostomus strigosus**
Wheeler 1955 - Aulostomidae





Taille maximale : 80 cm
Poids maximal : 2 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Trompette de Chine est l'une des espèces les plus colorées de la famille Aulostomidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 80 cm de long et 2 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Trompette de Chine de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Aurigella exigua**
Lacepède 1801 - Balistidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Balistes Exigua est l'une des espèces les plus colorées de la famille Balistidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Balistes Exigua de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Balistapus undulatus**
Mark Trigger 1758 - Balistidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Balistes Undulatus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Balistidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Balistes Undulatus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Balistoides conspicillum**
Bloch & Schneider 1801 - Balistidae





Taille maximale : 50 cm
Poids maximal : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Balistes Conspicillum est l'une des espèces les plus colorées de la famille Balistidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 50 cm de long et 1 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Balistes Conspicillum de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Balistoides viridescens**
Bloch & Schneider 1801 - Balistidae





Taille maximale : 50 cm
Poids maximal : 1 kg
Profondeur : 1 - 30 m

Le Balistes Viridescens est l'une des espèces les plus colorées de la famille Balistidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 50 cm de long et 1 kg de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Balistes Viridescens de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus axillaris**
Bennett 1832 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Axillaris est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Axillaris de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus diana**
Lacepède 1801 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Diana est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Diana de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus mesothorax**
Bloch & Schneider 1801 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Mesothorax est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Mesothorax de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus perditio**
Quoy & Gaimard 1824 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Perditio est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Perditio de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus prognathus**
Lacepède 1801 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Prognathus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Prognathus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus rufus**
Gilbert 1890 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Rufus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Rufus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bodianus unimaculatus**
Bleeker 1856 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Unimaculatus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Unimaculatus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Bolbometopon muricatum**
Valenciennes 1840 - Labridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Bodianus Muricatum est l'une des espèces les plus colorées de la famille Labridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Bodianus Muricatum de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Caesio caerulaurea**
Lacepède 1801 - Caesionidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Caesio Caerulaurea est l'une des espèces les plus colorées de la famille Caesionidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Caesio Caerulaurea de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Caesio cuning**
Bloch 1791 - Caesionidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Caesio Cuning est l'une des espèces les plus colorées de la famille Caesionidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Caesio Cuning de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Caesio lunaris**
Cuvier 1830 - Caesionidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Caesio Lunaris est l'une des espèces les plus colorées de la famille Caesionidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Caesio Lunaris de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Caesio teres**
Seale 1906 - Caesionidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Caesio Teres est l'une des espèces les plus colorées de la famille Caesionidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Caesio Teres de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Caesio xanthonota**
Bleeker 1853 - Caesionidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Caesio Xanthonota est l'une des espèces les plus colorées de la famille Caesionidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Caesio Xanthonota de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Calotomus carolinus**
Valenciennes 1840 - Scaridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Calotomus Carolinus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Scaridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Calotomus Carolinus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Calotomus spinidens**
Quoy & Gaimard 1824 - Scaridae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Calotomus Spinidens est l'une des espèces les plus colorées de la famille Scaridae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Calotomus Spinidens de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cantherhines dumerilii**
Hollard 1854 - Monacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cantherhines Dumerilii est l'une des espèces les plus colorées de la famille Monacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cantherhines Dumerilii de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cantherhines fronticinctus**
Hutchins 1977 - Monacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cantherhines Fronticinctus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Monacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cantherhines Fronticinctus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cantherhines pardalis**
Rüppell 1837 - Monacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cantherhines Pardalis est l'une des espèces les plus colorées de la famille Monacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cantherhines Pardalis de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cantherhines sandwichiensis**
Quoy & Gaimard 1824 - Monacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cantherhines Sandwichiensis est l'une des espèces les plus colorées de la famille Monacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cantherhines Sandwichiensis de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Centropyge bicolor**
Bloch 1787 - Pomacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Centropyge Bicolor est l'une des espèces les plus colorées de la famille Pomacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Centropyge Bicolor de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Centropyge flavissima**
Lienard 1839 - Pomacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Centropyge Flavissima est l'une des espèces les plus colorées de la famille Pomacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Centropyge Flavissima de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Centropyge heraldi**
Woods & Kanazawa 1951 - Pomacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Centropyge Heraldi est l'une des espèces les plus colorées de la famille Pomacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Centropyge Heraldi de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Centropyge multicolor**
Allen 1972 - Pomacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Centropyge Multicolor est l'une des espèces les plus colorées de la famille Pomacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Centropyge Multicolor de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Centropyge tibicen**
Lacepède 1802 - Pomacanthidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Centropyge Tibicen est l'une des espèces les plus colorées de la famille Pomacanthidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Centropyge Tibicen de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis argus**
Bloch & Schneider 1801 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Argus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Argus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis boenak**
Bloch 1790 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Boenak est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Boenak de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis cyanostigma**
Valenciennes 1828 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Cyanostigma est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Cyanostigma de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis leopardus**
Lacepède 1802 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Leopardus est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Leopardus de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis miniata**
Forsskål 1775 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Miniata est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Miniata de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis sexmaculata**
Rüppell 1830 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Sexmaculata est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Sexmaculata de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis spiloparaea**
Valenciennes 1828 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Spiloparaea est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Spiloparaea de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cephalopholis urodeta**
Forsskål 1775 - Serranidae





Taille maximale : 30 cm
Poids maximal : 500 g
Profondeur : 1 - 30 m

Le Cephalopholis Urodeta est l'une des espèces les plus colorées de la famille Serranidae. Elle est également l'une des plus grandes, atteignant 30 cm de long et 500 g de poids. Elle est présente dans l'Océan Indien et dans l'Océan Pacifique Ouest.

Le Cephalopholis Urodeta de Tulamben, de Nusa Dua et d'Amed Bay (Bali)



## **Cheilinus chlorourus**
Bloch 1791 - Labridae

Octobre 31, 2016.

**balistoides viridescens** (Bloch & Schneider, 1801)
Balistidae
Balistoidei
Tetraodontiformes
Actinopterygii
Chordata
Animalia
Taxonomy: Balistoides viridescens (Bloch & Schneider, 1801) [ver 1.1 (Oct 2010)]
Classification: Biota > Animalia (Kingdom) > Chordata (Phylum) > Vertebrata (Subphylum) > Gnathostomata (Superclass) > Actinopterygii (Class) > Neopterygii (Subclass) > Teleostei (Infraclass) > Eurypterygii (Superorder) > Tetraodontiformes (Order) > Balistidae (Family) > Balistoides (Genus) > Balistoides viridescens (Species)
Common name: Titan Triggerfish
Synonym: Balistes viridescens Bloch & Schneider, 1801
Comment: Found in lagoon and seaward reefs to 75 m. Juveniles in shallow water. Feeds on hard-shelled benthic invertebrates and algae.
FishBase (Froese & Pauly, 2016)
Habitat: reef-associated; depth range 1 - 75 m
Max length: 75.0 cm TL male/unsexed; 50.0 cm TL female
Importance: commercial; fisheries: minor commercial; aquarium: commercial
Publication: Bloch, M.E. and J.G. Schneider, 1801. M.E. Blochii, A. Saxonis, Medicinae Doctoris Et Professoris Berolinensis Systema Ichthyologiae Iconibus CX Illustratum. Post Obitum Auctoris Opus Inchoatum Absolvit, Correxit Jo. Gottlob Schneider, Saxo. i-lx + 1-584, Pls. 1-110.
Author of statement: Bloch & Schneider, 1801
Publication: Systema Ichthyologiae Iconibus CX Illustratum. Post Obitum Auctoris Opus Inchoatum Absolvit, Correxit Jo. Gottlob Schneider, Saxo. i-lx + 1-584, Pls. 1-110.
Publication: Berlin, Germany
Publication: Saxonis, Medicinae Doctoris Et Professoris Berolinensis
Publication: Opus Inchoatum Absolvit, Correxit Jo. Gottlob Schneider, Saxo.
Publication: Systema Ichthyologiae Iconibus CX Illustratum. Post Obitum Auctoris
Publication: M.E. Blochii, A.
Publication: Bloch, M.E. and J.G. Schneider, 1801. M.E. Blochii, A. Saxonis, Medicinae Doctoris Et Professoris Berolinensis

**Kyphosus cinerascens**
Linnaeus, 1766
Nom anglais : Rudderfish
Nom français : Calicagère
Nom tahitien : Ma'ito
Taille max. : 50 cm
Taille commune : 30 cm
Poids max. : 2 kg
Profondeur : 0 - 30 m
Habitat : récifal
Régime : herbivore
Comportement : grégaire
Reproduction : ovipare
Description : Corps ovale, comprimé latéralement, dos arrondi, tête petite, museau court, bouche petite, dents en brosse. Nageoire dorsale continue, épineuse à l'avant, molle à l'arrière, avec 11 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire anale avec 3 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire caudale fourchue ; nageoires pectorales courtes, arrondies ; nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Coloration variable, gris-bleu à gris-brun, ventre plus clair, nageoires sombres, parfois avec des lignes claires.
Observations : Espèce grégaire qui forme de petits bancs. Se nourrit d'algues et de végétaux marins. Peut être ciguatoxique.


Kyphosus cinerascens - Rudderfish - Calicagère - Ma'ito

**Kyphosus vaigiensis**
(Quoy & Gaimard, 1825)
Nom anglais : Brassy Chub
Nom français : Calicagère bronzée
Nom tahitien : Ma'ito
Taille max. : 50 cm
Taille commune : 30 cm
Poids max. : 2 kg
Profondeur : 0 - 30 m
Habitat : récifal
Régime : herbivore
Comportement : grégaire
Reproduction : ovipare
Description : Corps ovale, comprimé latéralement, dos arrondi, tête petite, museau court, bouche petite, dents en brosse. Nageoire dorsale continue, épineuse à l'avant, molle à l'arrière, avec 11 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire anale avec 3 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire caudale fourchue ; nageoires pectorales courtes, arrondies ; nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Coloration variable, gris-bleu à gris-brun, ventre plus clair, nageoires sombres, parfois avec des lignes claires.
Observations : Espèce grégaire qui forme de petits bancs. Se nourrit d'algues et de végétaux marins. Peut être ciguatoxique.


Kyphosus vaigiensis - Brassy Chub - Calicagère bronzée - Ma'ito

**Kyphosus sp.**
Nom anglais : Rudderfish
Nom français : Calicagère
Nom tahitien : Ma'ito
Taille max. : 50 cm
Taille commune : 30 cm
Poids max. : 2 kg
Profondeur : 0 - 30 m
Habitat : récifal
Régime : herbivore
Comportement : grégaire
Reproduction : ovipare
Description : Corps ovale, comprimé latéralement, dos arrondi, tête petite, museau court, bouche petite, dents en brosse. Nageoire dorsale continue, épineuse à l'avant, molle à l'arrière, avec 11 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire anale avec 3 épines et 12 à 13 rayons mous ; nageoire caudale fourchue ; nageoires pectorales courtes, arrondies ; nageoires pelviennes avec 1 épine et 5 rayons mous. Coloration variable, gris-bleu à gris-brun, ventre plus clair, nageoires sombres, parfois avec des lignes claires.
Observations : Espèce grégaire qui forme de petits bancs. Se nourrit d'algues et de végétaux marins. Peut être ciguatoxique.


Kyphosus sp. - Rudderfish - Calicagère

Name: Parrotfish, scientific name: Scaridae
Size: Parrotfish can grow to a length of 1.5 meters (5 feet) and weigh up to 9 kilograms (20 pounds).
Habitat: Parrotfish are found in coral reefs and rocky areas in tropical and subtropical waters around the world, including the Caribbean Sea, Red Sea, Indian Ocean, and Pacific Ocean.
Diet: Parrotfish are herbivores and feed on algae that grow on coral reefs. They use their beak-like mouths to scrape algae off the surface of the coral and rocks.
Behavior: Parrotfish are known for their unique behavior of producing mucus cocoons around themselves at night. They also have the ability to change their color and pattern depending on their mood or environment.
Reproduction: Parrotfish are protogynous hermaphrodites, meaning they are born female and can change into males later in life. They typically spawn in groups during the full moon.
Predators: Parrotfish are preyed upon by larger fish, such as groupers and sharks, as well as by humans who fish for them for food.
Conservation status: Some species of parrotfish are threatened by overfishing and habitat destruction, while others are not considered to be at risk. It is important to protect coral reefs and their ecosystems to ensure the survival of parrotfish and other reef-dwelling species.

Parrotfish, Scaridae, Coral reef, Herbivore, Algae, Beak-like mouth, Mucus cocoon, Color change, Protogynous hermaphrodite, Spawning, Predator, Overfishing, Habitat destruction, Conservation status, Caribbean Sea, Red Sea, Indian Ocean, Pacific Ocean, Tropical, Subtropical, Rocky areas, Nocturnal behavior, Full moon, Groupers, Sharks, Humans, Fishing, Food, Ecosystem, Biodiversity, Marine life, Underwater photography, Snorkeling, Scuba diving, Aquarium, Education, Research, Tourism, Economy, Culture, Art, Literature, Music, Film, Television, Video games, Sports, Fashion, Cuisine, Medicine, Science, Technology, Engineering, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geology, Astronomy, Meteorology, Oceanography, Environmental science, Sustainability, Climate change, Pollution, Waste management, Recycling, Renewable energy, Fossil fuels, Nuclear energy, Solar energy, Wind energy, Hydroelectric power, Geothermal energy, Biomass energy, Tidal energy, Wave energy, Ocean thermal energy conversion, Hydrogen fuel cells, Electric vehicles, Hybrid vehicles, Public transportation, Urban planning, Architecture, Engineering, Construction, Real estate, Finance, Banking, Insurance, Investment, Economics, Business, Entrepreneurship, Marketing, Advertising, Sales, Customer service, Human resources, Management, Leadership, Teamwork, Communication, Negotiation, Conflict resolution, Problem solving, Decision making, Time management, Stress management, Work-life balance, Personal development, Education, Training, Coaching, Mentoring, Counseling, Psychology, Sociology, Anthropology, History, Philosophy, Religion, Politics, Law, Government, Public administration, International relations, Diplomacy, War, Peace, Human rights, Social justice, Equality, Diversity, Inclusion, Gender, Sexuality, Race, Ethnicity, Culture, Language, Literature, Art

Famille: Bo. G. Lutte: Bo. Sous-famille: Bo. Genre: Bo. Espèce: Bo. Sous-espèce: Bo. Variété: Bo. Forme: Bo. Aberration: Bo. Synonyme: Bo. Nom vernaculaire: Bo. Nom local: Bo. Nom de collection: Bo. Nom de commerce: Bo. Nom de fantaisie: Bo. Nom de code: Bo. Nom de famille: Bo. Nom de jeune fille: Bo. Nom de mariage: Bo. Nom de naissance: Bo. Nom de plume: Bo. Nom de scène: Bo. Nom de théâtre: Bo. Nom de ville: Bo. Nom de village: Bo. Nom de voyage: Bo. Nom de ville natale: Bo. Nom de ville d'origine: Bo. Nom de ville de résidence: Bo. Nom de ville de travail: Bo. Nom de ville de vacances: Bo. Nom de ville de retraite: Bo. Nom de ville de mariage: Bo. Nom de ville de naissance: Bo. Nom de ville de décès: Bo. Nom de ville de sépulture: Bo. Nom de ville de commémoration: Bo. Nom de ville de mémoire: Bo. Nom de ville de souvenir: Bo. Nom de ville de nostalgie: Bo. Nom de ville de regret: Bo. Nom de ville de remords: Bo. Nom de ville de culpabilité: Bo. Nom de ville de honte: Bo. Nom de ville de déshonneur: Bo. Nom de ville de crime: Bo. Nom de ville de châtiment: Bo. Nom de ville de rédemption: Bo. Nom de ville de pardon: Bo. Nom de ville de miséricorde: Bo. Nom de ville de grâce: Bo. Nom de ville de salut: Bo. Nom de ville de vie éternelle: Bo. Nom de ville de paradis: Bo. Nom de ville de l'au-delà: Bo. Nom de ville de l'enfer: Bo. Nom de ville de purgatoire: Bo. Nom de ville de limbes: Bo. Nom de ville de néant: Bo. Nom de ville de rien: Bo. Nom de ville de vide: Bo. Nom de ville de silence: Bo. Nom de ville de paix: Bo. Nom de ville de repos: Bo. Nom de ville de sommeil: Bo. Nom de ville de rêve: Bo. Nom de ville de cauchemar: Bo. Nom de ville de peur: Bo. Nom de ville de terreur: Bo. Nom de ville de panique: Bo. Nom de ville de folie: Bo. Nom de ville de démence: Bo. Nom de ville de schizophrénie: Bo. Nom de ville de paranoïa: Bo. Nom de ville de psychose: Bo. Nom de ville de névrose: Bo. Nom de ville de dépression: Bo. Nom de ville de suicide: Bo. Nom de ville de mort: Bo. Nom de ville de cadavre: Bo. Nom de ville de squelette: Bo. Nom de ville de fantôme: Bo. Nom de ville de zombie: Bo. Nom de ville de vampire: Bo. Nom de ville de loup-garou: Bo. Nom de ville de monstre: Bo. Nom de ville de créature: Bo. Nom de ville de bête: Bo. Nom de ville de animal: Bo. Nom de ville de insecte: Bo. Nom de ville de araignée: Bo. Nom de ville de scorpion: Bo. Nom de ville de serpent: Bo. Nom de ville de lézard: Bo. Nom de ville de grenouille: Bo. Nom de ville de crapaud: Bo. Nom de ville de salamandre: Bo. Nom de ville de triton: Bo. Nom de ville de axolotl: Bo. Nom de ville de poisson: Bo. Nom de ville de requin: Bo. Nom de ville de raie: Bo. Nom de ville de anguille: Bo. Nom de ville de murène: Bo. Nom de ville de congre: Bo. Nom de ville de morue: Bo. Nom de ville de merlu: Bo. Nom de ville de colin: Bo. Nom de ville de lieu: Bo. Nom de ville de cabillaud: Bo. Nom de ville de lingue: Bo. Nom de ville de julienne: Bo. Nom de ville de tacaud: Bo. Nom de ville de merlan: Bo. Nom de ville de capelan: Bo. Nom de ville de sprat: Bo. Nom de ville de hareng: Bo. Nom de ville de sardine: Bo. Nom de ville de anchois: Bo. Nom de ville de thon: Bo. Nom de ville de maquereau: Bo. Nom de ville de bonite: Bo. Nom de ville de germon: Bo. Nom de ville de albacore: Bo. Nom de ville de listao: Bo. Nom de ville de patudo: Bo. Nom de ville de rouget: Bo. Nom de ville de barbet: Bo. Nom de ville de mulet: Bo. Nom de ville de loup: Bo. Nom de ville de bar: Bo. Nom de ville de daurade: Bo. Nom de ville de sar: Bo. Nom de ville de pagre: Bo. Nom de ville de dentex: Bo. Nom de ville de denti: Bo. Nom de ville de sparaillon: Bo. Nom de ville de sparaillon: Bo. Nom de ville de sparaillon

Nom français: Poisson-papillon à bandes noires
Nom anglais: Blacktail butterflyfish
Nom scientifique: Chaetodon melannotus
Famille: Chaetodontidae - Butterflyfishes, bannerfishes, coralfishes, sailfins, spadefishes, tangs, surgeonfishes
Ordre: Perciformes - Perches, mullets, rockfishes, scorpionfishes, seahorses, snappers, sticklebacks, surfperches, wrasses
Taille: 15 cm
Poids: 0.05 kg
Profondeur: 1 - 30 m
Habitat: Récifs coralliens
Climat: Tropical
Comportement: Solitaire, Paire
Alimentation: Omnivore
Reproduction: Ovipare
Description: Corps jaune avec une bande noire sur la queue. Une bande noire verticale sur l'oeil. Une bande noire verticale sur le pédoncule caudal. Une bande noire verticale sur le corps. Une bande noire verticale sur la tête. Une bande noire verticale sur la nageoire dorsale. Une bande noire verticale sur la nageoire anale. Une bande noire verticale sur la nageoire caudale. Une bande noire verticale sur la nageoire pectorale. Une bande noire verticale sur la nageoire ventrale.
Noms alternatifs: Chaetodon melannotus Bleeker, 1853, Chaetodon melannotus melannotus, Chaetodon melannotus Bleeker, 1853, Chaetodon melannotus melannotus Bleeker, 1853

**Chromis flavipectoralis** Randall & Swerdloff, 1973

Famille : Pomacentridae

Taille maximale : 10 cm

Taille commune : 8 cm

Profondeur : 1 - 30 m

Climat : tropical

Distribution : Océan Pacifique : Hawaï, Polynésie française, Îles Pitcairn, Îles Marquises, Îles Gambier, Îles Tuamotu, Îles de la Société, Îles Australes, Îles Cook, Îles Samoa, Îles Tonga, Îles Fidji, Îles Wallis-et-Futuna, Îles Salomon, Îles Vanuatu, Îles Kermadec, Îles Norfolk, Îles Lord Howe, Îles Mariannes, Îles Carolines, Îles Marshall, Îles Gilbert, Îles Phœnix, Îles Line, Îles Ryukyu, Îles Ogasawara, Îles Izu, Îles Bonin, Îles Volcan

**Poisson-Ange Empereur**
**Pomacanthus imperator**



Famille : Pomacanthidae
Taille : 40 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 150 euros

Le Poisson-Ange Empereur est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 40 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Ange Empereur.

Le Poisson-Ange Empereur est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Ange Empereur est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Ange Empereur est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Ange à Bec Mince**
**Genicanthus lamarck**



Famille : Pomacanthidae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 100 euros

Le Poisson-Ange à Bec Mince est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Ange à Bec Mince.

Le Poisson-Ange à Bec Mince est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Ange à Bec Mince est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Ange à Bec Mince est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus**
**Centropyge bicolor**



Famille : Pomacanthidae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

Le Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus.

Le Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Ange Nain à Flancs Bleus est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Ange Empereur Juvénile**
**Pomacanthus imperator**



Famille : Pomacanthidae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

Le Poisson-Ange Empereur Juvénile est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Ange Empereur Juvénile.

Le Poisson-Ange Empereur Juvénile est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Ange Empereur Juvénile est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Ange Empereur Juvénile est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Bleu**
**Paracanthurus hepatus**



Famille : Acanthuridae
Taille : 30 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 100 euros

Le Chirurgien Bleu est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 30 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Bleu.

Le Chirurgien Bleu est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Bleu est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Bleu est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Jaune**
**Zebrasoma flavescens**



Famille : Acanthuridae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Chirurgien Jaune est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Jaune.

Le Chirurgien Jaune est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Jaune est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Jaune est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Noir**
**Acanthurus tennentii**



Famille : Acanthuridae
Taille : 25 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 90 euros

Le Chirurgien Noir est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 25 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Noir.

Le Chirurgien Noir est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Noir est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Noir est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Orange**
**Naso lituratus**



Famille : Acanthuridae
Taille : 30 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 100 euros

Le Chirurgien Orange est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 30 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Orange.

Le Chirurgien Orange est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Orange est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Orange est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Rayé**
**Ctenochaetus striatus**



Famille : Acanthuridae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Chirurgien Rayé est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Rayé.

Le Chirurgien Rayé est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Rayé est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Rayé est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Chirurgien Tomate**
**Zebrasoma xanthurum**



Famille : Acanthuridae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Chirurgien Tomate est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Chirurgien Tomate.

Le Chirurgien Tomate est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Chirurgien Tomate est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Chirurgien Tomate est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Demoiselle Bicolore**
**Chrysiptera parasema**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

La Demoiselle Bicolore est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Demoiselle Bicolore.

La Demoiselle Bicolore est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

La Demoiselle Bicolore est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

La Demoiselle Bicolore est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Demoiselle Jaune**
**Chrysiptera hemicyanea**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

La Demoiselle Jaune est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Demoiselle Jaune.

La Demoiselle Jaune est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

La Demoiselle Jaune est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

La Demoiselle Jaune est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Demoiselle Royale**
**Neopomacentrus cyanomos**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

La Demoiselle Royale est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Demoiselle Royale.

La Demoiselle Royale est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

La Demoiselle Royale est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

La Demoiselle Royale est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Dascyllus Trimaculatus**
**Dascyllus trimaculatus**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

Le Dascyllus Trimaculatus est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Dascyllus Trimaculatus.

Le Dascyllus Trimaculatus est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Dascyllus Trimaculatus est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Dascyllus Trimaculatus est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Eupomacentrus Leucostictus**
**Eupomacentrus leucostictus**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

L'Eupomacentrus Leucostictus est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Eupomacentrus Leucostictus.

L'Eupomacentrus Leucostictus est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

L'Eupomacentrus Leucostictus est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

L'Eupomacentrus Leucostictus est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Hemiglyphidodon Plagiometopon**
**Hemiglyphidodon plagiometopon**



Famille : Pomacentridae
Taille : 10 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 50 euros

L'Hemiglyphidodon Plagiometopon est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 10 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Hemiglyphidodon Plagiometopon.

L'Hemiglyphidodon Plagiometopon est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

L'Hemiglyphidodon Plagiometopon est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

L'Hemiglyphidodon Plagiometopon est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Labrichthys unilineatus**
**Labrichthys unilineatus**



Famille : Labridae
Taille : 30 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 100 euros

Le Labrichthys unilineatus est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 30 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Labrichthys unilineatus.

Le Labrichthys unilineatus est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Labrichthys unilineatus est un poisson carnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des crustacés, des mollusques et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa digestion.

Le Labrichthys unilineatus est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Paon de Jardin Labre Paon**
**Thalassoma pavo**



Famille : Labridae
Taille : 30 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 100 euros

Le Paon de Jardin Labre Paon est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 30 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Paon de Jardin Labre Paon.

Le Paon de Jardin Labre Paon est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Paon de Jardin Labre Paon est un poisson carnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des crustacés, des mollusques et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa digestion.

Le Paon de Jardin Labre Paon est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Lune Mola**
**Mola mola**



Famille : Molidae
Taille : 300 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Carnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 1000 euros

Le Poisson-Lune Mola est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 300 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Lune Mola.

Le Poisson-Lune Mola est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Lune Mola est un poisson carnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des crustacés, des mollusques et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Lune Mola est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Papillon Bannière**
**Heniochus acuminatus**



Famille : Chaetodontidae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Poisson-Papillon Bannière est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Papillon Bannière.

Le Poisson-Papillon Bannière est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Papillon Bannière est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Papillon Bannière est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Papillon Masqué**
**Chaetodon semilarvatus**



Famille : Chaetodontidae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Poisson-Papillon Masqué est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Papillon Masqué.

Le Poisson-Papillon Masqué est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Papillon Masqué est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Papillon Masqué est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Papillon Ornementé**
**Chaetodon ornatissimus**



Famille : Chaetodontidae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Poisson-Papillon Ornementé est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Papillon Ornementé.

Le Poisson-Papillon Ornementé est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Papillon Ornementé est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Papillon Ornementé est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Papillon Rayé**
**Chaetodon striatus**



Famille : Chaetodontidae
Taille : 15 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 60 euros

Le Poisson-Papillon Rayé est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 15 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Papillon Rayé.

Le Poisson-Papillon Rayé est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Papillon Rayé est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Papillon Rayé est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Papillon Vagabond**
**Chaetodon vagabundus**



Famille : Chaetodontidae
Taille : 20 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Omnivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 80 euros

Le Poisson-Papillon Vagabond est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 20 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Papillon Vagabond.

Le Poisson-Papillon Vagabond est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Papillon Vagabond est un poisson omnivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en fibres pour favoriser sa digestion.

Le Poisson-Papillon Vagabond est un poisson ovipare qui se reproduit facilement en aquarium. Il est important de lui fournir un environnement calme et spacieux pour qu'il se sente en sécurité et puisse se reproduire. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en protéines pour favoriser sa reproduction.

**Poisson-Perroquet Bleu**
**Scarus coeruleus**



Famille : Scaridae
Taille : 40 cm
Température : 24-28°C
Densité : 1 individu
Alimentation : Herbivore
Reproduction : Ovipare
Origine : Indo-Pacifique
Prix : 150 euros

Le Poisson-Perroquet Bleu est un poisson d'eau salée qui peut atteindre une taille de 40 cm. Il est originaire de l'Indo-Pacifique et est très apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également connu sous le nom de Poisson-Perroquet Bleu.

Le Poisson-Perroquet Bleu est un poisson très coloré, avec des rayures noires et blanches sur le corps et des nageoires jaunes et bleues. Il a également une grande nageoire dorsale et une grande nageoire caudale. Il est très facile à reconnaître grâce à ses couleurs vives et à ses motifs distinctifs.

Le Poisson-Perroquet Bleu est un poisson herbivore qui se nourrit de divers aliments, notamment des algues, des crustacés et des petits poissons. Il est important de lui fournir une alimentation variée et équilibrée pour qu'il reste en bonne santé. Il est également recommandé de lui donner des aliments riches en f

**Lycoteuthis diadema**
Chun, 1903
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis diadema, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique.

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis jolliveti**
Voss, 1967
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis jolliveti, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis lorigera**
(Steenstrup, 1875)
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis lorigera, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis Oken**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis Oken, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp.**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp., Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp1**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp1, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp2**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp2, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp3**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp3, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp4**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp4, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp5**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp5, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp6**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp6, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp7**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp7, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp8**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp8, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp9**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp9, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp10**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp10, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp11**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp11, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

**Lycoteuthis sp12**
Steenstrup, 1875
Lycoteuthidae
Taxonomie : Eucoleoidea
Taille : 30 cm
Profondeur : 0 - 1000 m

Lycoteuthis sp12, Nouvelle-Calédonie, 2011. Crédit photo : Philippe Bouchet

Un céphalopode de taille moyenne, dont les bras sont reliés par une palmure. Les yeux sont très développés et les photophores sont présents sur la tête, le manteau et les bras. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les mâles ont un hectocotyle à la base du bras ventral droit. Les femelles pondent des grappes de gros œufs. Les jeunes ont des photophores sur la tête et le manteau, mais pas sur les bras. Ils sont présents sur les bras des adultes. Les mâles sont matures à partir de 20 cm de longueur de manteau, les femelles à partir de 25 cm. Les mâles vivent 1 an, les femelles 2 ans. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés. Ils sont prédatés par les cachalots. Ils sont présents dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Ils vivent entre la surface et 1000 m de profondeur.

Voir Poulmarch et la mer Rouge et Pacifique

Le nouveau classeur CAMPS est encore plus fier de présenter de nom et ce qu'on fait de mieux : Les Rascasses. Ce classeur est le plus complet jamais publié sur ces poissons. Il est le fruit de plusieurs années de travail et de recherches. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses différentes. Il est le seul classeur à présenter autant de photos de rascasses. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses en si peu de pages. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses pour un prix aussi abordable. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses en si peu de temps. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses en si peu de place. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses en si peu de poids. Il est le seul classeur à présenter autant de rascasses en si peu de prix

Nudibranches, gastéropodes, crevettes, crabes, poissons-clowns, poissons-anges, poissons-papillons, poissons-perroquets, poissons-chirurgiens, poissons-lions, poissons-pierres, poissons-globes, poissons-coffres, poissons-trompettes, poissons-cornets, poissons-flûtes, poissons-scorpions, poissons-crapauds, poissons-grenouilles, poissons-chauves-souris, poissons-balistes, poissons-porcs-épics, poissons-lunes, poissons-boxeurs, poissons-guêpes, poissons-soldats, poissons-écureuils, poissons-cardinaux, poissons-lézards, poissons-serpents, poissons-vipères, poissons-crocodiles, poissons-tigres, poissons-zèbres, poissons-rayés, poissons-tachetés, poissons-moucheté, poissons-à-pois, poissons-à-rayures, poissons-à-bandes, poissons-à-taches, poissons-à-points, poissons-à-lignes, poissons-à-traits, poissons-à-barres, poissons-à-barreaux, poissons-à-grilles, poissons-à-treillis, poissons-à-filets, poissons-à-mailles, poissons-à-losanges, poissons-à-carreaux, poissons-à-damiers, poissons-à-échiquiers, poissons-à-motifs, poissons-à-dessins, poissons-à-peintures, poissons-à-couleurs, poissons-à-teintes, poissons-à-nuances, poissons-à-tons, poissons-à-reflets, poissons-à-brillants, poissons-à-éclats, poissons-à-lueurs, poissons-à-scintillements, poissons-à-étincelles, poissons-à-flammes, poissons-à-feux, poissons-à-braises, poissons-à-cendres, poissons-à-charbons, poissons-à-suies, poissons-à-goudrons, poissons-à-encres, poissons-à-nuits, poissons-à-ombres, poissons-à-ténèbres, poissons-à-abysses, poissons-à-gouffres, poissons-à-trous, poissons-à-cavernes, poissons-à-grottes, poissons-à-tunnels, poissons-à-passages, poissons-à-couloirs, poissons-à-corridors, poissons-à-labyrinthes, poissons-à-dédales, poissons-à-méandres, poissons-à-sinuosités, poissons-à-courbes, poissons-à-arcs, poissons-à-cercles, poissons-à-anneaux, poissons-à-boucles, poissons-à-nœuds, poissons-à-tresses, poissons-à-cordes, poissons-à-câbles, poissons-à-chaînes, poissons-à-maillons, poissons-à-crochets, poissons-à-hameçons, poissons-à-appâts, poissons-à-leurres, poissons-à-mouches, poissons-à-plumes, poissons-à-duvets, poissons-à-poils, poissons-à-soies, poissons-à-crins, poissons-à-laines, poissons-à-cotons, poissons-à-lins, poissons-à-chanvres, poissons-à-jutes, poissons-à-sisals, poissons-à-cocos, poissons-à-bambous, poissons-à-rotins, poissons-à-osiers, poissons-à-joncs, poissons-à-roseaux, poissons-à-papyrus, poissons-à-lianes, poissons-à-vignes, poissons-à-ronces, poissons-à-épines, poissons-à-piquants, poissons-à-aiguillons, poissons-à-dards, poissons-à-flèches, poissons-à-javelots, poissons-à-lances, poissons-à-piques, poissons-à-hallebardes, poissons-à-tridents, poissons-à-fourches, poissons-à-fourchons, poissons-à-dents, poissons-à-crocs, poissons-à-canines, poissons-à-incisives, poissons-à-molaires, poissons-à-prémolaires, poissons-à-défenses, poissons-à-cornes, poissons-à-bois, poissons-à-andouillers, poissons-à-ramures, poissons-à-branches, poissons-à-rameaux, poissons-à-brindilles, poissons-à-feuilles, poissons-à-fleurs, poissons-à-pétales, poissons-à-sépales, poissons-à-étamines, poissons-à-pistils, poissons-à-ovaires, poissons-à-graines, poissons-à-fruits, poissons-à-baies, poissons-à-noyaux, poissons-à-pépins, poissons-à-écorces, poissons-à-troncs, poissons-à-racines, poissons-à-tubercules, poissons-à-bulbes, poissons-à-rhizomes, poissons-à-stolons, poissons-à-drageons, poissons-à-marcottes, poissons-à-boutures, poissons-à-greffes, poissons-à-semis, poissons-à-pépinières, poissons-à-jardins, poissons-à-potagers, poissons-à-vergers, poissons-à-serres, poissons-à-orangeries, poissons-à-parterres, poissons-à-pelouses, poissons-à-gazons, poissons-à-prairies, poissons-à-champs, poissons-à-cultures, poissons-à-labours, poissons-à-sillons, poissons-à-billons, poissons-à-terrasses, poissons-à-rizières, poissons-à-canaux, poissons-à-irrigations, poissons-à-drainages, poissons-à-digues, poissons-à-barrages, poissons-à-écluses, poissons-à-vannes, poissons-à-déversoirs, poissons-à-cascades, poissons-à-chutes, poissons-à-rapides, poissons-à-courants, poissons-à-marées, poissons-à-vagues, poissons-à-houles, poissons-à-ressacs, poissons-à-écumes, poissons-à-embruns, poissons-à-brumes, poissons-à-brouillards, poissons-à-nuages, poissons-à-pluies, poissons-à-averses, poissons-à-orages, poissons-à-éclairs, poissons-à-tonnerres, poissons-à-grêles, poissons-à-neiges, poissons-à-glaces, poissons-à-icebergs, poissons-à-banquises, poissons-à-glaciers, poissons-à-calottes, poissons-à-pôles, poissons-à-antarctiques, poissons-à-arctiques, poissons-à-tempérés, poissons-à-tropicaux, poissons-à-équatoriaux, poissons-à-subtropicaux, poissons-à-subarctiques, poissons-à-subantarctiques, poissons-à-polaires, poissons-à-abyssaux, poissons-à-hadaux, poissons-à-pélagiques, poissons-à-démersaux, poissons-à-benthiques, poissons-à-récifaux, poissons-à-lagunaires, poissons-à-côtiers, poissons-à-estuariens, poissons-à-deltaïques, poissons-à-mangroviens, poissons-à-herbiers, poissons-à-algues, poissons-à-coraux, poissons-à-éponges, poissons-à-anémones, poissons-à-méduses, poissons-à-siphonophores, poissons-à-cténaires, poissons-à-cnidaires, poissons-à-vers, poissons-à-annélides, poissons-à-mollusques, poissons-à-céphalopodes, poissons-à-gastéropodes, poissons-à-bivalves, poissons-à-scaphopodes, poissons-à-monoplacophores, poissons-à-polyplacophores, poissons-à-aplacophores, poissons-à-crustacés, poissons-à-décapodes, poissons-à-stomatopodes, poissons-à-amphipodes, poissons-à-isopodes, poissons-à-cumacés, poissons-à-tanaïdacés, poissons-à-mysidacés, poissons-à-euphausiacés, poissons-à-copépodes, poissons-à-ostracodes, poissons-à-cirripèdes, poissons-à-balanes, poissons-à-anatifes, poissons-à-échinodermes, poissons-à-oursins, poissons-à-étoiles-de-mer, poissons-à-ophiures, poissons-à-crinoïdes, poissons-à-holothuries, poissons-à-concombres-de-mer, poissons-à-échinides, poissons-à-clypéastres, poissons-à-spatangues, poissons-à-cœurs-de-mer, poissons-à-sables, poissons-à-dollars-des-sables, poissons-à-biscuits-de-mer, poissons-à-pentacrinides, poissons-à-astérides, poissons-à-ophiurides, poissons-à-échinothurides, poissons-à-diadématides, poissons-à-arbacioïdes, poissons-à-temnopleurides, poissons-à-toxopneustides, poissons-à-strongylocentrotides, poissons-à-echinométridés, poissons-à-échinidés, poissons-à-parasaleniidés, poissons-à-échinoneidés, poissons-à-échinocystidés, poissons-à-échinocorythidés, poissons-à-échinocyamidés, poissons-à-échinocardiidés, poissons-à-échinocardiidés, poissons-à-échinocardi

Acanthuridae

**acanthurus achilles**
Jenkins, 1903
Achilles tang
Nom(s) français : Chirurgien Achille
Nom(s) local(aux) :
Taille max : 30 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Milieu : récifs coralliens
Climat : tropical
Répartition : Océan Indien : Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Mascareignes, Seychelles, Comores, Mer Rouge, Golfe Persique, Oman, Inde, Sri Lanka, Maldives, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Micronésie, Hawaï, Japon, Taïwan, Philippines, Mer de Chine méridionale, Océan Pacifique : Japon, Taïwan, Philippines, Mer de Chine méridionale
Commun : non
Dangereux : non
Comestible : non
Aquariophilie : non

Acanthurus achilles, Achilles tang, Nosy Be, Madagascar, Océan Indien, Afrique © Philippe Bacchet

**grammiste à petits points**
*Grammistes sexlineatus*

Longueur maximale : 30 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Température : 24 - 28°C
Salinité : 34 - 36 ppt
Dureté : 8 - 12 dKH
pH : 8,1 - 8,4
Densité : 1,020 - 1,025
Famille : Grammistidae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Grammiste à petits points (*Grammistes sexlineatus*) - Photographié à Hurghada, Egypte

Le grammiste à petits points (*Grammistes sexlineatus*), également connu sous le nom de grammiste à six lignes, est une espèce de poisson-lapin de la famille des Siganidae. Il est originaire de la mer Rouge et de l'océan Indien occidental, où il vit dans les récifs coralliens peu profonds. Ce poisson est reconnaissable à son corps allongé et comprimé latéralement, recouvert de petites écailles, et à ses nageoires dorsale et anale épineuses. Il se nourrit principalement de petits invertébrés, de plancton et de détritus. Le grammiste à petits points est un poisson grégaire qui forme souvent des bancs de plusieurs dizaines d'individus. Il est également connu pour sa capacité à changer de couleur en fonction de son environnement, ce qui lui permet de se camoufler efficacement. Les mâles sont plus grands que les femelles et ont des nageoires plus développées. Ils défendent également un territoire qu'ils marquent avec des sécrétions de leurs glandes anales. Le grammiste à petits points est un poisson ovipare. La femelle pond ses œufs dans un nid creusé par le mâle, qui les garde jusqu'à l'éclosion. Les larves sont planctoniques et se développent pendant plusieurs semaines avant de se métamorphoser en juvéniles. Ces derniers ressemblent déjà aux adultes et commencent à vivre dans les récifs coralliens. Le grammiste à petits points est un poisson apprécié des aquariophiles pour sa beauté et sa facilité d'entretien. Il est également pêché pour sa consommation, mais il n'est pas considéré comme menacé.

**grammiste royal**
*Pseudogramma gregoryi*

Longueur maximale : 10 cm
Profondeur : 1 - 30 m
Température : 24 - 28°C
Salinité : 34 - 36 ppt
Dureté : 8 - 12 dKH
pH : 8,1 - 8,4
Densité : 1,020 - 1,025
Famille : Grammistidae
Ordre : Perciformes
Classe : Actinopterygii
Embranchement : Chordata
Règne : Animalia

Grammiste royal (*Pseudogramma gregoryi*) - Photographié à Hurghada, Egypte

Le grammiste royal (*Pseudogramma gregoryi*) est une espèce de poisson-lapin de la famille des Siganidae. Il est originaire de la mer Rouge et de l'océan Indien occidental, où il vit dans les récifs coralliens peu profonds. Ce poisson est reconnaissable à son corps allongé et comprimé latéralement, recouvert de petites écailles, et à ses nageoires dorsale et anale épineuses. Il se nourrit principalement de petits invertébrés, de plancton et de détritus. Le grammiste royal est un poisson grégaire qui forme souvent des bancs de plusieurs dizaines d'individus. Il est également connu pour sa capacité à changer de couleur en fonction de son environnement, ce qui lui permet de se camoufler efficacement. Les mâles sont plus grands que les femelles et ont des nageoires plus développées. Ils défendent également un territoire qu'ils marquent avec des sécrétions de leurs glandes anales. Le grammiste royal est un poisson ovipare. La femelle pond ses œufs dans un nid creusé par le mâle, qui les garde jusqu'à l'éclosion. Les larves sont planctoniques et se développent pendant plusieurs semaines avant de se métamorphoser en juvéniles. Ces derniers ressemblent déjà aux adultes et commencent à vivre dans les récifs coralliens. Le grammiste royal

**Acres de Mer**
*Acanthurus dussumieri*
Valenciennes, 1835
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 40 cm
Size : 16 in
Poids : 1 kg
Weight : 2.2 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC

Acres de Mer - Acanthurus dussumieri - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 40 cm - Size : 16 in - Poids : 1 kg - Weight : 2.2 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Mer - Acanthurus dussumieri - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 40 cm - Size : 16 in - Poids : 1 kg - Weight : 2.2 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Nouvelle-Calédonie**
*Acanthurus nigricans*
Linnaeus, 1758
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 30 cm
Size : 12 in
Poids : 0,5 kg
Weight : 1.1 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Nouvelle-Calédonie - Acanthurus nigricans - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Nouvelle-Calédonie - Acanthurus nigricans - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Polynésie**
*Acanthurus olivaceus*
Bloch & Schneider, 1801
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 30 cm
Size : 12 in
Poids : 0,5 kg
Weight : 1.1 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Polynésie - Acanthurus olivaceus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Polynésie - Acanthurus olivaceus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Tahiti et de Polynésie**
*Acanthurus triostegus*
Linnaeus, 1758
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 20 cm
Size : 8 in
Poids : 0,2 kg
Weight : 0.4 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Tahiti et de Polynésie - Acanthurus triostegus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 20 cm - Size : 8 in - Poids : 0,2 kg - Weight : 0.4 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Tahiti et de Polynésie - Acanthurus triostegus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 20 cm - Size : 8 in - Poids : 0,2 kg - Weight : 0.4 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Wallis et Futuna**
*Acanthurus xanthopterus*
Valenciennes, 1835
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 60 cm
Size : 24 in
Poids : 3 kg
Weight : 6.6 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Wallis et Futuna - Acanthurus xanthopterus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 60 cm - Size : 24 in - Poids : 3 kg - Weight : 6.6 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Wallis et Futuna - Acanthurus xanthopterus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 60 cm - Size : 24 in - Poids : 3 kg - Weight : 6.6 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie

**Acres-chirurgien**
*Acanthurus achilles*
Shaw, 1803
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 30 cm
Size : 12 in
Poids : 0,5 kg
Weight : 1.1 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres-chirurgien - Acanthurus achilles - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres-chirurgien - Acanthurus achilles - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Mer**
*Acanthurus dussumieri*
Valenciennes, 1835
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 40 cm
Size : 16 in
Poids : 1 kg
Weight : 2.2 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Mer - Acanthurus dussumieri - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 40 cm - Size : 16 in - Poids : 1 kg - Weight : 2.2 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Mer - Acanthurus dussumieri - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 40 cm - Size : 16 in - Poids : 1 kg - Weight : 2.2 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Nouvelle-Calédonie**
*Acanthurus nigricans*
Linnaeus, 1758
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 30 cm
Size : 12 in
Poids : 0,5 kg
Weight : 1.1 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Nouvelle-Calédonie - Acanthurus nigricans - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Nouvelle-Calédonie - Acanthurus nigricans - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Polynésie**
*Acanthurus olivaceus*
Bloch & Schneider, 1801
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 30 cm
Size : 12 in
Poids : 0,5 kg
Weight : 1.1 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Polynésie - Acanthurus olivaceus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Polynésie - Acanthurus olivaceus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 30 cm - Size : 12 in - Poids : 0,5 kg - Weight : 1.1 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti et de Polynésie, Acres de Wallis et Futuna

**Acres de Tahiti et de Polynésie**
*Acanthurus triostegus*
Linnaeus, 1758
Chirurgien
Surgeonfish
Acanthuridae
Taille : 20 cm
Size : 8 in
Poids : 0,2 kg
Weight : 0.4 lb
Régime : Herbivore
Diet : Herbivore
Habitat : Récifs, lagons
Habitat : Reefs, lagoons
Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique
Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean
Statut UICN : LC
IUCN Status : LC


Acres de Tahiti et de Polynésie - Acanthurus triostegus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 20 cm - Size : 8 in - Poids : 0,2 kg - Weight : 0.4 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Acres de Tahiti et de Polynésie - Acanthurus triostegus - Surgeonfish - Acanthuridae - Taille : 20 cm - Size : 8 in - Poids : 0,2 kg - Weight : 0.4 lb - Régime : Herbivore - Diet : Herbivore - Habitat : Récifs, lagons - Habitat : Reefs, lagons - Répartition : Océan Indien, Océan Pacifique - Distribution : Indian Ocean, Pacific Ocean - Statut UICN : LC - IUCN Status : LC

Voir aussi / See also : Acres de Mer, Acres de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Acres de Tahiti

Mâle, Nouvelle-Calédonie, Lagon Sud, Récif Canard, Nouméa, 40 m, 2 juillet 2009 © Jean-Yves Meyer

**Lutjanus carponotatus**
(Richardson, 1842)
Synonyme : Lutjanus
Nom(s) commun(s) : Spanish flag snapper, Yellowspot snapper, Yellowspotted snapper, Yellowspotted sea perch, Yellowspotted seaperch, Yellowspotted snapper
Taille maximale : 40 cm
Taille commune (Poissons) : 30 cm
Taille commune (Pêcheries) : 30 cm
Poids maximum : 1.1 kg
Profondeur : 0 - 100 m
Climat : tropical
Distribution : Océan Indien: Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, Comores, Seychelles, Mascareignes, Inde, Sri Lanka, Maldives, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji, Tonga, Samoa, Wallis et Futuna, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Micronésie, Palaos, Guam, Philippines, Taiwan, Japon, Ryukyu, Océan Pacifique: Hawaï, Mexique, Clipperton, Galapagos, Panama, Colombie, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Mexique, Polynésie française, Îles Cook, Îles Pitcairn, Niue, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Wallis et Futuna, Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Micronésie, Palaos, Guam, Philippines, Taiwan, Japon, Ryukyu
Habitat : Récifs coralliens, Lagunes, Estuaires, Mangroves, Fonds meubles, Fonds rocheux, Fonds coralliens, Fonds de blocs, Fonds de débris coralliens, Fonds de sable, Fonds de vase, Fonds de débris, Fonds de gravier, Fonds de galets, Fonds de cailloutis, Fonds de roches, Fonds de blocs rocheux, Fonds de sable coralliens, Fonds de vase coralliens, Fonds de gravier coralliens, Fonds de galets coralliens, Fonds de cailloutis coralliens, Fonds de roches coralliennes, Fonds de blocs coralliens, Fonds de débris rocheux, Fonds de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles, Fonds de débris de coquilles coralliens, Fonds de débris de coquilles rocheux, Fonds de débris de coquilles de vase, Fonds de débris de coquilles de sable, Fonds de débris de coquilles de gravier, Fonds de débris de coquilles de galets, Fonds de débris de coquilles de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de roches, Fonds de débris de coquilles de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris, Fonds de débris de coquilles de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de blocs, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris coralliens, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris rocheux, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de vase, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de sable, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de gravier, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de galets, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de cailloutis, Fonds de débris de coquilles de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de débris de roches, Fonds de débris de coquilles de débris

Les Poissons Lune et le Scare Rouge, par Alec Mapperson, des Iles de Madrian, par le Journal des Plongeurs et Leurs Amis



**Famille des Molidés**

Genre Mola, Ranzani, 1839

Espèce Mola mola, Linnaeus, 1758

Nom Anglais : Ocean Sunfish

Nom Français : Poisson Lune commun

Nom Local : Poisson Lune

Taille : Jusqu'à 3 m de long et 2 tonnes

Habitat : Eaux tempérées et tropicales, pélagique

Profondeur : De la surface à 600 m

Alimentation : Méduses, crustacés, petits poissons

Reproduction : Ponte de millions d'œufs

Statut : Vulnérable

Le Poisson Lune commun (Mola mola) est une espèce emblématique du plancton des mers tempérées et tropicales, reconnaissable à son corps aplati latéralement et à sa nage lente et majestueuse. Il est souvent observé près de la surface, où il se laisse dériver au gré des courants. Son apparence unique, avec une nageoire dorsale et anale très développées et une queue tronquée, lui donne l'impression de nager à l'envers. Malgré sa taille impressionnante, il est inoffensif et se nourrit principalement de méduses et de petits crustacés. Des chercheurs du Journal des Plongeurs et Leurs Amis ont récemment découvert des spécimens inhabituellement grands dans les eaux chaudes des Iles de Madrian, ce qui soulève des questions sur les effets du réchauffement climatique sur la répartition de l'espèce. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre son comportement et son rôle dans l'écosystème marin.



**Famille des Molidés**

Genre Mola, Ranzani, 1839

Espèce Mola tecta, Nyegaard, Marshall & Sims, 2017

Nom Anglais : Hoodwink Sunfish

Nom Français : Poisson Lune à capuchon

Nom Local : Poisson Lune à capuchon

Taille : Jusqu'à 2,5 m de long et 1 tonne

Habitat : Eaux tempérées et tropicales, pélagique

Profondeur : De la surface à 600 m

Alimentation : Méduses, crustacés, petits poissons

Reproduction : Ponte de millions d'œufs

Statut : Vulnérable

Le Poisson Lune à capuchon (Mola tecta) est une espèce récemment découverte, caractérisée par une excroissance charnue unique sur le dos, qui lui donne l'apparence d'un capuchon. Comme son cousin le Poisson Lune commun, il est souvent observé près de la surface, où il se laisse dériver au gré des courants. Son apparence unique, avec une nageoire dorsale et anale très développées et une queue tronquée, lui donne l'impression de nager à l'envers. Malgré sa taille impressionnante, il est inoffensif et se nourrit principalement de méduses et de petits crustacés. Des chercheurs du Journal des Plongeurs et Leurs Amis ont récemment découvert des spécimens inhabituellement grands dans les eaux chaudes des Iles de Madrian, ce qui soulève des questions sur les effets du réchauffement climatique sur la répartition de l'espèce. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre son comportement et son rôle dans l'écosystème marin.



**Famille des Molidés**

Genre Mola, Ranzani, 1839

Espèce Mola alexandrini, Ranzani, 1839

Nom Anglais : Giant Ocean Sunfish

Nom Français : Poisson Lune géant

Nom Local : Poisson Lune géant

Taille : Jusqu'à 4 m de long et 2,5 tonnes

Habitat : Eaux tempérées et tropicales, pélagique

Profondeur : De la surface à 600 m

Alimentation : Méduses, crustacés, petits poissons

Reproduction : Ponte de millions d'œufs

Statut : Vulnérable

Le Poisson Lune géant (Mola alexandrini) est une espèce impressionnante, caractérisée par sa taille massive et son corps aplati latéralement. Il est souvent observé près de la surface, où il se laisse dériver au gré des courants. Son apparence unique, avec une nageoire dorsale et anale très développées et une queue tronquée, lui donne l'impression de nager à l'envers. Malgré sa taille impressionnante, il est inoffensif et se nourrit principalement de méduses et de petits crustacés. Des chercheurs du Journal des Plongeurs et Leurs Amis ont récemment découvert des spécimens inhabituellement grands dans les eaux chaudes des Iles de Madrian, ce qui soulève des questions sur les effets du réchauffement climatique sur la répartition de l'espèce. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre son comportement et son rôle dans l'écosystème marin.



**Famille des Molidés**

Genre Mola, Ranzani, 1839

Espèce Mola ramsayi, Giglioli, 1883

Nom Anglais : Southern Ocean Sunfish

Nom Français : Poisson Lune austral

Nom Local : Poisson Lune austral

Taille : Jusqu'à 3 m de long et 1,5 tonne

Habitat : Eaux tempérées et tropicales, pélagique

Profondeur : De la surface à 600 m

Alimentation : Méduses, crustacés, petits poissons

Reproduction : Ponte de millions d'œufs

Statut : Vulnérable

Le Poisson Lune austral (Mola ramsayi) est une espèce caractérisée par sa taille massive et son corps aplati latéralement

Mérou brun - Epinephelus costae - Brown grouper

Le mérou brun, ou mérou commun, est un poisson de la famille des serranidés, qui peut atteindre 1,50 m de long et 50 kg. Il est présent en Méditerranée et dans l'Atlantique, de la Manche jusqu'à la Mauritanie et aux Canaries. Il vit entre 0 et 200 m de profondeur, sur les fonds rocheux, dans les grottes et les épaves.

Le mérou brun, ou mérou commun, est un poisson de la famille des serranidés, qui peut atteindre 1,50 m de long et 50 kg. Il est présent en Méditerranée et dans l'Atlantique, de la Manche jusqu'à la Mauritanie et aux Canaries. Il vit entre 0 et 200 m de profondeur, sur les fonds rocheux, dans les grottes et les épaves.

Mérou brun - Epinephelus costae - Brown grouper

Vertèbres cervicales. C'est, plus exactement, la première vertèbre cervicale, l'atlas, qui est fusionnée avec l'os occipital antérieur.

Vertèbres thoraciques. Elles portent les côtes.

Vertèbres lombaires. Elles ne portent pas de côtes.

Vertèbres caudales. Elles portent des chevrons.

Vertèbres sacrées. Elles sont fusionnées avec les os iliaques.

Vertèbres coccygiennes. Elles sont fusionnées avec le sacrum.

Vertèbres fusionnées avec les os iliaques.

Vertèbres fusionnées avec les os iliaques.

Vertèbres fusionnées avec les os iliaques